

Pflanzenschutzmittel-Tabellen 2026



DI Hubert Köppl

Pflanzenbau, Auf der Gugl 3, 4021 Linz, T +43 50 6902 1412

Hubert.Koeppel@lk-ooe.at

www.ooe.lko.at

Version: 12.03.2026

Der aktuelle Zulassungsstand kann unter <https://psmregister.baes.gv.at/psmregister/> abgerufen werden

Alle Angaben sind ohne Gewähr

Getreide - Unkrautbekämpfung im Frühjahr (Auswahl)

Produkt	Wirkstoff	HRAC ²⁾ Einstufung neu alt		Menge/ha, Zulassung(7)	Einsatzstadium	ca. Preis/ha ¹⁾	Kleiten- labkraut	Kamille	Ehrenpreis	Vogelmiere	Taubnessel	Stiefmütterchen	Holzhahn	Knöterich	Gänsefuß/Melde	Kornblume	Ackerdistel (Rosette)	Windhalm	Ackerfuch- schwanzgras/ Weidelgras	Abstände Oberflächen- gewässer in m ³⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragungsgefahr in m ⁴⁾	
ALS-Hemmer ("Sulfonylharnstoffe", etc.) temperaturunabhängig (Anwendung ab +1°C, Nachfröste bis - 3°C)																						
Altivate + Silwet Top	Mesosulfuron	2	B	150-250 g + 0,1 l WR,WWW, WT	11-25 (Herbst) 20- 32 (Frühjahr)	33,90 - 47,90	+	+	+	+	+	+	+	-	+	-	+(+)	+++	+++ (250 g)	1	G-20 (Herbst) G-10 Frühjahr	-
Atlantis OD	Mesosulfuron +Iodosulfuron +Mefenpyrdiethyl	2	B	0,5-1,5 l; SHW,WHW,WR,WWW, WT	13-32	24,50 - 73,50	+	+++	+	+++	+	+	+	-	+	-	+(+)	+++	+++ (1 l)	1	G-15	-
Broadway + Netzmittel	Pyroxulam+Florasulam+ Cloquintocet	2	B	125 (-220) g +0,6 (-1,1) l; DI,SHW,WR,WHW,WT,WWW	12-32	35,90 - 75,80	+++	+++	+++	+++	++(+)	++(+)	+++	+++	++	+++ (220 g)	++	+++	+++ (ab 200 g)	1	-	-
Concert SX	Metsulfuronmethyl+ Thifensulfuronmethyl	2	B	150 g: DI,WHW,WR,WT,WWW 100 g: SG,SH,SHW,SWW	13-29	28,20 - 42,40	++	+++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	++	-	5/5/5/1 5/5/1/1	G-20 (über 100 g/ha) G-10 (bis 100 g/ha)	-
Express SX	Tribenuronmethyl	2	B	30-60 g: DI,WH,WHW,WG,WR,WT,WWW; 30- 45 g: SG,SH,SHW,SR,ST,SWW	13-37; 13-29	21,10 - 42,20	++	+++	+	+++	+++	+++	+++	++	++(+)	++	+++	-	-	1	-	-
Flame Duo	Florasulam +Tribenuronmethyl	2	B	60 g: DI, WG, WH, WHW, WWW, WR, WT, SH, SG, SH, SHW, SR, SWW	13-32	15,60	+++	+++	+	+++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	1	G-10 (Winterungen)	
Harmony extra SX	Tribenuronmethyl+ Thifensulfuronmethyl	2	B	100-120 g: DI,WH,WHW,WG,WR,WT,WWW; 75 g: SG,SH,SHW,SR,ST,SWW	13-29	53,40 - 64,10 40,00	++	+++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++(+)	++(+)	+(+)	-	5/5/1/1	-	15 (über 75 g/ha) 5 (bis 75 g/ha)
Husar OD	Iodosulfuron + Mefenpyrdiethyl	2	B	100 ml: DI,WG,WHW,WT,WR,WWW; 75 ml: SG,SHW,SWW	13-29 (32)	30,50 - 40,70	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++(+)	++(+)	-	1	G-20 (Wi-Getr.)	
Husar Plus	Iodosulfuron +Mesosulfuron +Mefenpyrdiethyl	2	B	200 ml: WR,WHW,WWW,WT,DI 150 ml: SG,SW,SHW	13-32 13-30	29,90–39,90	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++(+)	+++	+	1	G-10 (Wi-Getr.) n.z. So-Getr.	-
Obelisk	Mesosulfuron +Iodosulfuron +Mefenpyrdiethyl	2	B	0,3-0,4 kg: DI,WHW,WT,WR,WWW	21-32	28,80-38,40	+	+++	+	+++	+	+	+	-	+	+	++	+++	+(+)	1	G-20	-
Pointer Plus	Metsulfuronmethyl +Tribenuronmethyl +Florasulam	2	B	50 g: WG, WH, WHW, WWW, WR, WT, SG, SH, SHW, SWW	13-39	33,30	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	20/20/20/1	n.z. in Wi-Getr.	-
Saracen	Florasulam	2	B	100 ml: WG,WHW,WR, WWW,WT 75 ml:SG, SH,SHW,SWW	13-39 13-29	11,90 8,90	+++	+++	+	+++	++	+	++	+++	+	+++	+++	-	-	1	G-5 (100 ml/ha) G-10 (150 ml/ha)	-
Saracen Max	Florasulam +Tribenuronmethyl	2	B	25 g: DI,SG,SHW,SWW,WG,WHW,WWW,WR,WT	13-32 (39: WG,WR,WW,WT _DI,WH)	18,30	+++	+++	+	+++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	1	G-5 (Wi-Getr.)	-
Sekator OD ⁶⁾	Amidosulfuron +Iodosulfuron +Mefenpyrdiethyl	2	B	150 ml; DI SHW,WG,WHW,WWW,WR,WT, SG	13-32	19,20	+++	+++	++	+++	++(+)	++	+++	+++	+++	++	++(+)	(+)	-	10	G-10	-
Sekator Plus (Sekator OD+Atlantis OD)	Amidosulfuron +Iodosulfuron +Mesosulfuron +Mefenpyrdiethyl	2	B	150+500 ml; DI,SHW,WHW,WWW,WR,WT	13-32	43,70	+++	+++	++	+++	++(+)	++	+++	+++	+++	++	++(+)	+++	+++ (1 l Atlantis OD)	10	G-15	-

Produkt	Wirkstoff	HRAC ²⁾ Einstufung neu alt		Menge/ha, Zulassung 7)	Einsatzstadium	ca. Preis/ha ¹⁾	Ketten- abkraut	Kamille	Ehrenpreis	Vogelmiere	Taubnessel	Stiefmütterchen	Holzzahn	Knöterich	Gänsefuß/Melde	Kornblume	Ackerdistel (Rosette)	Windhalm	Ackerfuch- schwanzgras/ Weidelgras	Abstände Oberflächen- gewässer in m ³⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragungsgefahr in m ⁴⁾		
Photosynthesehemmer																							
temperaturunabhängig (Anwendung ab +1°C, Nachfröste bis -3°C)																							
Lentipur 500 ⁵⁾	Chlortoluron (CTU)	5	C2	1,5-2,1 l; WG,WHW, WWW,WT, WR	13-29	18,70 - 26,20	-	+++	+	+++	+	+	++	+	++	(+)	-	+++	+	(3 l)	1	G-5	-
Synthetische Auxine ("Wuchsstoffe" bzw. wuchsstoffähnliche Wirkstoffe)																							
etwas höhere Temperaturansprüche (Anwendung ab +5 bis +8 °C-außer Pixxaro EC, keine Nachfröste)																							
Dicopur 500 flüssig	2,4-D	4	O	1,5 l; DI,SG,SH,SHW,SR,ST,SWW,WG,WH,WHW,WR ,WT,WWW	13-29	20,80	-	-	-	-	+	+	+	-	+++	++	+++	-	-	1	-	-	
Dicopur M	MCPA	4	O	1,5 l; DI,SG,SH,SHW,SR,ST,SWW,WG,WH,WHW,WR ,WT,WWW	13-39	13,20	-	-	-	-	-	+	+	-	+++	++	+++	-	-	1	-	-	
Duplosan Super	Dichlorprop-P+Mecoprop-P+MCPA	4	O	2,5 l; DI,SG,SH,SHW,SR,ST,SWW,WG,WH,WHW,WR ,WT,WWW	13-32	39,80	+++	+	++	+++	+	+	+	++	+++	++	+++	-	-	1	G-20	-	
Gentis	2,4-D+Fluroxypyr	4	O	1,25 l; SG,SH,SHW,ST,SWW,WG,WH,WHW,WR, WT,WWW	13-29	27,60	+++	++	+(+)	+++	++	+(+)	+++	+++	+++	++	+++	-	-	5/5/1/1	-	-	
Pixxaro EC	Halauxifenmethyl+ Fluroxypyr+Cloquintocet	4	O	0,25-0,5 l; DI,SG,SHW,SR,SWW,WG,WHW,WR,WT, WWW	13-45	17,80 - 35,60	+++	++(+)	++	+++	+++	+	+++	+++	+++		+	-		-/20/10/5	G-/-/20/5	-	
Tandus	Fluroxypyr	4	O	0,7-1,0 l; G,SH,SHW,SWW,WH,WHW,WR,WT,WWW	21-47	10,50 - 14,90	+++	++	+	+++	+	++	+++	+++	-		-	-		1	-	-	
Tomigan 200	Fluroxypyr	4	O	0,7-0,9 l; G,SH,SWW,WR,WT,WWW	13-39	12,70-16,30	+++	++	+	+++	+	++	+++	+++	-		-	-		1	-	-	
Kombinations-Präparate																							
Aniten flüssig (Duplosan Super + Saracen)	Dichlorprop-P+Mecoprop-P+MCPA+Florasulam	4,2	O,B	2 l + 0,1 l; WG,WH,WHW,WR,WT,WWW; 2,5 l + 0,075 l; SG,SH,SHW,SWW	13-29	39,10-38,60	+++	+++	++	++	++	+++	++	+++	+++	+++	+++	-	-	1	G-20	-	
Ariane C	Fluroxypyr+Florasulam +Clopyralid	4,2,4	O,B,O	1,0-1,5 l; DI,SG,SH,SHW,SWW,WG,WH,WHW,WR,WT,W WW	13-30 Wi-Getr.) (39	35,50 - 53,30	+++	+++	++	+++	++	+	+++	+++	++	+++	+++	-	-	1	-	-	
Artus	Metsulfuronmethyl+ Carfentrazone-ethyl	2,14	B,E	50 g; DI,SG,ST,SHW,SR,SWW,SH,WG,WH,WHW,WR ,WT,WWW	13-32	41,20	++(+)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	++	++	-	-	1	G-20	-	
Avoxa	Pinoxaden+Pyroxsulam+Clo quintocet	1,2	A,B	1,35-1,8 l; WR,WT,WWW	22-32	53,30 - 71,10	++	++	++	+++	++	++	+++	+++	++	++	-	+++	+++ (1,8 l)	1	-	-	
Axial Komplett	Pinoxaden+Florasulam+ Cloquintocet	1,2	A, B	1,0-1,3 l; DI,SG,ST,SHW,SR,SWW,WG,WHW,WR,WT,W WW	13-29	49,10 - 63,80	+++	+++	-	+++	+	-	+++	+++	+	+++	++	+++	+++ (1,3 l)	5	-	-	
Broadway plus + Netzmittel	Pyroxsulam + Florasulam + Halauxifen-methyl +	2,4	B,O	50 g + 0,8 l Netzmittel: SHW, SW; 50-60 g + 0,8 - 1 l Netzmittel: WDI, WHW,WWW,WT,WR	21-32	50,60-63,10	+++	+++	+++	+++	+++ (60 g)	+++	+++	+++	+++	+++ (60 g)	+++ (60 g)	+++	+++ (60 g)	1	G- -/5/5/1 (SD, SWW)	-/5/5/1	
Concert + Pixxaro Pack	Metsulfuronmethyl+ Thifensulfuronmethyl + Halauxifenmethyl+ Fluroxypyr+Cloquintocet	2,4	B,O	100 g + 0,25 l; DI,WG,WR,WT,WHW,WWW; 88 g + 0,22 l; SG,SH,SR,ST,SHW,SWW	13-29	43,40 38,20	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	+(+)	-	-/20/10/5	G-/-/20/5	-	
Croupier OD	Metsulfuronmethyl+ Fluroxypyr	2,4	B,O	0,67 l; WG,WR,WT, WWW,SG,SWW	20-39 (Wi-Getr.) 12-39 (So-Getr.)	26,40	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	-	-	5/1/1/1 (Wi-Getr.) 5/5/1/1 (So-Getr.)	G-20	-	
Express SX+ Pixxaro EC	Tribenuronmethyl+ Fluroxypyr+Halauxifen- methyl	2,4	B,O	25 g + 0,25 l; DI,SG,SHW,SR,SWW,WG,WHW,WR,WT,WWW	13-29 (37 Wi- Getr.)	36,20	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	-/20/10/5	G -/-/20/5	-	
Fluorstar XL	Florasulam + Fluroxypyr	2,4	B,O	1,8 l; WWW, WG , 1,5 l; SWW, SG	22-39	37,50; 31,20	+++	+++	+	+++	++	+	+++	+++	(+)	+++	+++	-	-	1	-	-	
Omnera LQM	Fluroxypyr+Metsulfuron- methyl+Thifensulfuron- methyl	4,2	O,B	1l; DI,SG,SHW,SWW,WG,WHW,WR,WT,WWW	20-39 (Wi-Getr.) 12-39 (So-Getr.)	35,70	+++	+++	++(+)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++(+)	++(+)	++	-	G-10/1/11 (Wi- Getr.) 5/1/1/1 (So-Getr.)	n.z		
Tomigan XL	Florasulam + Fluroxypyr	2,4	B, O	1,0-1,5 l; SG,SHW,SR,ST,SWW,WG,WHW,WR,WT,WW W	13-29 (39 Wi-Getr. außer WH)	22,10 - 33,20	+++	+++	+	+++	++	+	+++	+++	(+)	+++	+++	-	-	1	-	-	
Zypar	Florasulam+Halauxifen- methyl	2,4	B, O	1 l; DI,SG,SH,SHW,SR,ST,SWW,WG,WHW,WR,WT ,WWW	13-45	32,00	+++	+++	++	+++	+++	+	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	1	G-10	-	

Getreideherbizide für den Herbsteinsatz (Auswahl)

Produkt	Wirkstoff	HRAC ⁴⁾ Einstufung alt neu		Aufwand- menge/ha	Getreideart ¹⁵⁾	Anwendungs-zeit (BBCH Stadien)	Kleitenlabkraut	Kamillearten	Vogelmiere	Ehrenpreisarten	Taubnesselarten	Stiefmütterchen	Ausfallraps	Kornblume	Windhalm	Ackerfuchsschwanzgras, Raygräser	ca. Preise /ha ¹⁾	Abstände zu Oberflächen- gewässern in m ²⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragsungsgefahr in m ³⁾	
Arnold ¹³⁾	Diflufenican + Flufenacet	12,15	F1,K3	0,6* l	WG,WWW	VA, NA (10-13)	+++	++(+)	+++	++(+)	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++ (0,6 l)	?	20/10/5/5	G-20	
Axial 50 ⁶⁾	Pinoxaden	1	A	0,9 l	WG, WR, WHW, WWW, WT, DI	NA (13-29)	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	+++	48,20	1/1/1/1	-	-
Battle Delta ^{9,13)} /Nucleus ^{9,13)}	Diflufenican + Flufenacet	12,15	F1,K3	0,5-0,6* l	WG, WR, WWW, WHW, WT, DI	VA, NA (10-13)	+++	++(+)	+++	++(+)	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++ (0,6 l)	45,90-55,00/50,30-60,30	-/-/-15	G- -/-/-20	-
Battle Delta Flex ^{9,13)} (Battle Delta + BeFlex)	Diflufenican + Flufenacet + Beflubutamid	12,15,12	F1,K3,F1	0,33 + 0,33 l	WG, WWW	NA (10-13)	+++	++(+)	+++	++(+)	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++ (0,5+0,5 l)	53,6	-/-/-15	G- -/-/-20	-
Boxer + Cadou SC ¹⁴⁾	Prosulfocarb + Flufenacet	15	N (K3), K3	2,0-2,5 +0,4* l	DI, WG, WHW, WR, WWW, WT	VA, NA (10-13)	+++	++	+++	+++	+++	++	+	+	+++	+++ (0,5 l)	50,20 - 55,80	15/10/5/1	n.z.	
Boxer + Express SX	Prosulfocarb + Tribenuron-methyl	15,2	N (K3), B	2,5 l + 25 g	DI, WG, WR, WHW, WT, WWW	NA (ab 13)	+++	+++	+++	++	+++	+++	+++	++(+)	+++	++	48	15/10/5/1	n.z.	
Cadou SC ¹⁴⁾	Flufenacet	15	K3	0,3-0,5* l	DI, WG, WHW, WR, WWW, WT	VA, NA (bis ES 13)	++(+)	++(+)	+	-	++(+)	+	-	-	+++	+++ (0,5 l)	20,70 - 34,50	1	G-5 (0,3 l) G-10 (0,5 l)	-
Carmina Perfekt (Carmina 640 + Saracen Delta) ⁷⁾	Chlortoluron + Diflufenican + Florasulam	5,12,2	C2, F1, B	1,5 l + 75 ml	WG, WR, WHW, WWW, WT	NA (12-23)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+	51,1	20	G-20	-
Carpatus SC ¹³⁾	Diflufenican + Flufenacet	12,15	F1,K3	0,4-0,6* l	WG, WR, WWW, WT	VA, NA (10-13)	+++	++(+)	+++	++(+)	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++ (0,6 l)	36,30-54,40	-/20/10/5	G- -/20/20/20	-
Diflanil 500 SC	Diflufenican	12	F1	0,25-0,375 l	WG, WWW	NA (10-14)	++	++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	+	13,40-20,10	-/40/20/10	G- -/40/20/20	-
Fantasia	Prosulfocarb	15	N (K3)	2,5 - 5 l	WG, WR, WHW, WWW, WT	VA, NA (10-21)	+++	+	+++	++	+++	+	+	+	+++	+	22,70 - 45,50	15/10/5/1	n.z.	
Fence ^{11,13)}	Flufenacet	15	K3	0,25-0,5 l	WG, WWW	VA, NA (10-21)	++(+)	++(+)	+	-	++(+)	+	-	-	+++	+++ (0,5 l)	16,70-33,30	1	G--10	-
Flash 500 SC	Diflufenican	12	F1	0,28-	WG, WWW	V, NA (10-14)	++	++	+++	+++	+++	+++	++	++	(+)	-	?	15/10/5/5	G-20	-
Fluent 500 SC ^{11,13)}	Flufenacet	15	K3	0,4 l	WG, WR, WWW, WT	NA (10-13)	++(+)	++(+)	+	-	++(+)	+	-	-	+++	+++	21,8	1	G--10	-
Jura	Prosulfocarb + Diflufenican	15,12	N (K3),F1	3,5- 4,0 l	WG, WR, WHW, WWW, WT, DI	VA, NA (10-13)	+++	++(+)	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+	50,60-57,80	15/10/5/1	G-15/10/10/10	-
Jura + Glosset SC ^{10,13)}	Prosulfocarb + Diflufenican + Flufenacet	15,12,15	N (K3),F1,K3	3,5- 4,0 + 0,4 l	WG, WR, WWW, WT	VA, NA (10-13)	+++	++(+)	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	83,60-90,80	15/10/5/1	G-15/10/10/10	-
Jura Max	Prosulfocarb + Diflufenican	15,12	N (K3),F1	3 l	WG, WR, WHW, WWW, WT, DI	VA, NA (10-13)	+++	++(+)	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	+	?	20/10/10/10	G-20	-
Lentipur 500 ⁹⁾	Chlortoluron	5	C2	2,0 - 3,0 l	WG, WR, WHW, WWW ⁹⁾ , WT	VA (WWW,WHW); NA (ab 13-WG, WHW,WR,WT,WWW)	-	+++	+++	+	++(+)	+	-	++(+)	+++	++(+)	25,00 - 37,40	1	G-5	-
Kwizda Getreidepack-Herbst (Nucleus ^{9,13)} + Express SX)	Diflufenican + Flufenacet + Tribenuron-methyl	12,15,2	F1, K3, B	0,33 l + 20 g	WG, WR, WHW, WWW, WT, DI	NA (10-13)	++(+)	++(+)	+++	++(+)	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++ (0,6 l)	46,5	-/-/-15	G- -/-/-20	-
Mateno Pack (Cadou SC ¹⁴⁾ + Mateno Duo)	Flufenacet + Diflufenican + Aclonifen	15,12,34	K3, F1, S(F3)	0,25 + 0,35 l	DI, WG, WHW, WR, WT, WWW	VA, NA (10-13)	++(+)	++(+)	+++	+++	+++	+++	+++	+	+++	+++ (0,5 l)	37,5	10 (WG,WR) 20 (WWW,WT)	G-5	-
Mateno Pack (Cadou SC ¹⁴⁾ + Mateno Duo) + Express SX ¹²⁾	Flufenacet + Diflufenican + Aclonifen + Tribenuron-methyl	15,12,34,2	K3, F1, S(F3), B	0,25 + 0,35 l + 20 g	WG, WR, WT, WWW	NA (10-13)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++ (0,5 l)	53,3	10 (WG,WR) 20 (WWW,WT)	G-5	-
Mateno Trio Set (Mateno Duo + Cofeno)	Diflufenican + Aclonifen + Prosulfocarb	12,24,15	F1, S(F3), N	0,35 + 1,5-3,0 l	DI, WG, WHW, WR, WT, WWW	VA, NA (10-13)	+++	++(+)	+++	+++	+++	+++	+++	+	+++	+++ (3,0 l; VA))	?	VA: 15/10/5/5 NA: 15/10/5/1	n.z.	
Mateno Trio Set (Mateno Duo + Cofeno) + Express SX	Diflufenican + Aclonifen + Prosulfocarb + Tribenuron-methyl	12,24,15,2	F1, S(F3), N, B	0,35 + 1,5-3,0 l + 25 g	DI, WG, WHW, WR, WT, WWW	NA (10-13)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++ (3,0 l; VA))	?	VA: 15/10/5/5 NA: 15/10/5/1	n.z.	
Pontos ¹³⁾	Picolinafen + Flufenacet	12,15	F1,K3	0,5 - 1,0 l	WG, WHW, WR, WW, WT, DI	VA (1 l), NA (10-29, 0,5 l)	++(+)	++(+)	+++	+++	+++	+++	++	++(+)	+++	+++ (1 l)	32,60-65,20	15/10/5/1	G-20	-
Pontos ¹³⁾ + Express SX ¹²⁾	Picolinafen + Flufenacet+Tribenuron-methyl	12,15,2	F1,K3,B	0,5 l + 20 g	WG, WHW, WR, WW, WT, DI	NA (13-29)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++(+)	+++	+++ (1 l)	48,4	15/10/5/1	G-20	-

Getreideherbizide für den Herbsteinsatz (Auswahl)

Produkt	Wirkstoff	HRAC ⁴⁾ Einstufung alt neu	Aufwand- menge/ha	Getreideart ¹⁵⁾	Anwendungs-zeit (BBCH Stadien)	Klettenabkraut	Kamillearten	Vogelmiere	Ehrenpreisarten	Taubnesselarten	Stiefmütterchen	Ausfallraps	Kornblume	Windhalm	Ackerfuchsschwanzgras, Raygräser	ca. Preise /ha ¹⁾	Abstände zu Oberflächen- gewässern in m ²⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragungsgefahr in m ³⁾	
Roxy 800 EC + Diflanil 500 SC	Prosulfocarb + Diflufenican	15,12	N (K3),F1	2,5 l + 0,25 l	WG, WWW	NA (10-13)	+++	++(+)	+++	+++	+++	++	++	+++	+	41	-/40/20/10	n.z.	
Saracen + Lentipur 500 ⁵⁾	Florasulam + Chlortoluron	2,5	B, C2	75 ml + 1,5 l	WG, WR, WHW, WWW, WT	NA (10-13)	+++	+++	+++	+	+	+	+++	+++	+	30,3	1/1/1/1	15	-
Stomp Aqua	Pendimethalin	3	K1	3,5 l	WG, WR, WWW, WT	VA, NA (10-13)	++	++	+++	+++	+++	+	-	+(+)	(+)	77,00	20/20/10/5	G-5	20/20/10/5
Stomp Aqua + Lentipur 500 ⁵⁾	Pendimethalin + Chlortoluron	3,5	K1,C2	2 -(3) + 1,5 l	WG, WR, WWW ⁵⁾ , WT	VA, NA (13)	++(+)	+++	+++	+++	+++	++	+	+++	+(+)	67,80 - 91,40	20/20/10/5	G-5	20/20/10/5
Stomp Perfekt (Stomp Aqua + Carmina 640 ⁷⁾)	Pendimethalin + Chlortoluron + Diflufenican	3,5,12	K1,C2,F1	2,0 + 1,0	WG, WR, WWW, WT	NA (10-29, DI 10-25)	++(+)	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	+(+)	49,90	20/20/10/5	G-20	-
Trinity ⁸⁾	Pendimethalin + Chlortoluron + Diflufenican	3,5,12	F1,K1,C2,F1	2,0 l	WG, WR, WT, WWW	VA, NA (10-13)	++(+)	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	+(+)	47,2	-/20/15/5	G- /20/20/20	-
Viper Compact	Penoxsulam + Florasulam + Diflufenican	2,2,12	B,B,F1	1 l	WG, WR, WT, WHW, WWW, DI	NA (10-29)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	+	40,80	-/20/10	G-20	
Viper Compact + Lentipur 500 ⁵⁾	Penoxsulam + Florasulam + Diflufenican + Chlortoluron	2,2,12,5	B,B,F1,C2	0,75 + 1,5 l	WG, WHW, WWW ⁵⁾ , WR, WT	NA 13-29)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	+	51,2	-/20/10	G-20	
Viper Compact + Axial 50	Penoxsulam + Florasulam + Diflufenican + Pinoxaden	2,2,12,1	B,B,F1,A	0,75 + 0,9 l	WG, WHW, WWW, WR, WT, DI	NA (13-29)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	+++	83,00	-/20/10	G-20	

Legende:

+++ sehr gut wirksam
++ gut wirksam
+ schwach wirksam
- unwirksam

rot: Zusatzwirkung

1) ca. Preise 2025/26, größtes Gebinde, exkl. MwSt.

2) Regelabstand/50/75/90 % Abtriftminderungsklasse

3) Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in Meter (je nach Düse kann er unterschiedlich sein) und wenn angegeben ein bewachsener Grünstreifen (mit G und Meterangabe-gekennzeichnet) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden - außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Unkrautbekämpfung im Nachauflauf, Bodenbedeckung mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchte, rauhes Saatbett, Grünstreifen und Querdämme kann das Risiko reduziert werden.

4) Klassifizierung des Wirkungsmechanismus; Resistenzvermeidung durch Verwendung von Produkten aus verschiedenen Gruppen

5) nur 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode; bei Anwendung im WW im VA nur alle 2 Jahre auf der selben Fläche erlaubt; keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen, diesen Wirkstoff enthaltenden Mitteln; Sorteneinschränkung bei WW bei 3,0 l/ha

6) Mischbarkeit beachten

7) Keine Anwendung auf drainierten Flächen

8) Keine Anwendung auf gedrahteten Flächen zw. 1.11. und 15.3.

9) Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode, wobei die Anwendung nur alle 2 Jahre auf derselben Fläche erfolgen darf.

10) Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode, wobei die Anwendung nur alle 2 Jahre auf derselben Fläche erfolgen darf.

Keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen Mitteln, die den Wirkstoff Flufenacet enthalten.

11) Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode, wobei die Anwendung nur alle 3 Jahre auf derselben Fläche erfolgen darf.

Keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen Mitteln, die den Wirkstoff Flufenacet enthalten.

12) statt 20 g/ha Express SX sind als Mischpartner auch 40 g/ha Flame Duo möglich

13) bis 10.12.2026 zu verbrauchen

14) bis 5.12.2025 zu verbrauchen

* Aufwandmenge auf schweren Böden

15) Abkürzung Kulturen (EPPO-Code)DI-Dinkel (3SPEC); G-Gerste (3BARC); Getreide (3CERC); H-Hafer (3OATC); R-Roggen (3RYEC); T-Triticale (3TRIC); W-Weizen (3WHEC); SG-Sommergerste (SECCS); SH-Sommerhafer (AVESP);

SHW-Sommerhartweizen (TRZDS); ST-Sommertriticale (TTLSO); SWW-Sommerweichweizen (TRZAS); WG-Wintergerste (HORVW); WH-Winterhafer (AVESW); WHW- Winterhartweizen (TRZDW); WR-Winterroggen (SECCW);

WT- Wintertriticale (TTLWI); WWW-Winterweichweizen(TRZAW); WDI-Winterdinkel (3SPWC)

Getreidefungizide (Auswahl)

Getreidefungizide (Auswahl)																				
Produkt	Wirkstoffgehalt	Einstufung nach FRAC ¹	Getreideart ⁽⁵⁾	Menge/ha	ca. Preis/ha EUR ¹	Mehltau	Roste	Septoria tritici - vorbeugend	Septoria tritici - heilend	Septoria nodorum	DTR-Blattdürre	Zwergrost bei Gerste	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia/ Nicht- parasitäre Blattflecke	Wartefrist in Tagen	max. Anzahl der Anwendungen	Abstände zu Oberflächenge-wässern in m ³	Abstände zu Gewässern bei Abtragungsgefahr in m ⁴	
Azole und Mischungen																				
Caramba ²⁾ /Metfin ²⁾	60 g/l Metconazol		DI,G,R,T,W	1,5 l	?	+(+)	+++	++	++	++	++	+++	++	++	+	-**	2	5/5/5/1	-	-
Folicur ²⁾	250 g/l Tebuconazol	3	DI, G,R,T,W	1 - 1,25 l	16,10 - 20,10	+(+)	+++	+	+	++	++	+++	++	++	+	-**	2	10/5/5/1	G-10	-
Input Classic ²⁾	160 g/l Prothioconazol+ 300 g/l Spiroxamin	3 5	G,WR,WT, WHW,WWW, SHW,SWW	1,0-1,25 l	50,30-62,90	+++	+++	++(+)	++(+)	++(+)	++(+)	+++	++(+)	++(+)	+	-**	2	5/1/1/1	G-20	-
Jade ²⁾	125 g/l Prothioconazol+ 125 g/l Tebuconazol	3 3	G,R,T,W	0,8-1,0 l	17,20 - 21,50	++	+++	++	++	+++	+++	+++	++	+++	+	-**	2	5/5/5/1	G-10 (- ES 61)	5 (ab ES 61)
Joust ^(11, 14)	250 g/l Prothioconazol	3	DI,G,H,R,SHW,T, WHW,WWW,Eink orn, Emmer	0,8 l außer G, H, SR 0,6 l	19,10/ 14,30	+(+)	+++	++	++	+++ nur bei DI,EK, EM	++	+++	++	+++	+	35	2	1	G-20	-
Magnello ²⁾	250 g/l Tebuconazol + 100 g/l Difenconazol	3 3	DI,W	1,0 l	40,90	+(+)	+++ ⁽⁶⁾	++	++	++(+)	++	-	-	-	-	-**	1	5/1/1/1	G-10	-
Mystic 250 EW ²⁾	250 g/l Tebuconazol	3	DI,G,R,T,W	1 - 1,25 l	15,00 - 18,80	+(+)	+++	+	+	++	++	+++	++	++	+	-**	2	10/5/5/1	G-10	-
Pecari 300 EC ^{2,10,14)}	300 g/l Prothioconazol	3	SG, SHW,ST,SWW,W G,WHW,WR,WT, WWW	0,5-0,65 l	21,20 - 27,60	+(+)	++(+)	++(+)	++(+)	+++	++(+)	++(+)	++(+)	+++	+	35	2	10	-	-
Pronto Plus ²⁾	250 g/l Spiroxamine + 133 g/l Tebuconazol	5 3	DI,G,R,T,W	1,25-(1,5) l	40,40 (-48,50)	++(+)	+++	+	+	++	++(+)	+++	+	++(+)	+	35	2	-/20/15/15	G- 20	-/20/20/20
Prosaro ²⁾	125 g/l Prothioconazol+ 125 g/l Tebuconazol	3 3	DI,G,R,T,W	0,8-1,0 l	26,50 - 33,20	++	+++	++	++	+++	+++	+++	++	+++	+	-**	2	5/5/5/1	G-10 (- ES 61)	5 (ab ES 61)
Promino 300 EC ^{2,14)}	300 g/l Prothioconazol	3	SG, SHW,SR,SWW,W G,WHW,WR,WT, WWW,W	0,65 l	13,60	+(+)	++(+)	++(+)	++(+)	+++	++(+)	++(+)	++(+)	+++	+	35	2	1	G-15	-
Protendo 300 EC ^{2,10,14)}	300 g/l Prothioconazol	3	SG, SHW,ST,SWW,W G,WHW,WR,WT, WWW	0,65 l	16,00	+(+)	++(+)	++(+)	++(+)	+++	++(+)	++(+)	++(+)	+++	+	35	2	10	-	-
Protendo Extra ²⁾	125 g/l Prothioconazol+ 125 g/l Tebuconazol	3 3	DI,G,R,T,W	0,8-1,0 l	23,10 - 28,90	++	+++	++	++	+++	+++	+++	++	+++	+	-**	2	5/5/5/1	G-10 (- ES 61)	5 (ab ES 61)
Sirena ²⁾	60 g/l Metconazol	3	DI,G,R,T,W	1,5 l	45,80	+(+)	+++	++	++	++	++	+++	++	++	+	-**	2	5/5/5/1	-	-
Tebusha 25 EW ²⁾	250 g/l Tebuconazol	3	G,R,T,W	1,0 (W)-1,25 l	14,90 - 18,60	+(+)	+++ ⁽⁶⁾	+	+	++	++	+++	++	++	+	-**	2	10/5/5/1	G-10	-
Verben	200 g/l Prothioconazol + 50 g/l Proquinazid	3 13	G,R,T,W	0,8 - 1,0 l	42,20 - 52,80	++(+)	++(+)	++(+)	++(+)	+++	++(+)	+++	++(+)	+++	+	-**	1	5	-	10

Getreidefungizide (Auswahl)

Produkt	Wirkstoffgehalt	Einstufung nach FRAC	Getreideart ⁽⁵⁾	Menge/ha	ca. Preis/ha EUR ⁽¹⁾	Mehltau	Roste	Septoria tritici - vorbeugend	Septoria tritici - heilend	Septoria nodorum	DTR-Blattdürre	Zwergrost bei Gerste	Netzflecken	Rhynchosporium	Ramularia/ Nicht- parasitäre Blattflecke	Wartezeit in Tagen	max. Anzahl der Anwendungen	Abstände zu Oberflächengewässern in m ⁽³⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragungsgefahr in m ⁽⁴⁾	
Carboxamide und Kombinationen																				
Adexar top ^{7,8)}	62,5 g/l Fluxapyroxad + 45 g/l Metconazol	7 3	G,R,T,W	2 l	90,80	++	+++	++(+)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+	35	2	G-10	G-10	-
Ascra Xpro ⁸⁾	130 g/l Prothioconazol+ 65 g/l Bixafen+ 65 g/l Fluopyram	3 7	DI,G,H,R,T,W	0,9-1,5 l	51,60 - 85,90	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+	- **	1	5/1/1/1	G-10	-
Avastel Pack (Pioli + Soratel)	62,5 g/l Fluxapyroxad + 250 g/l Prothioconazol	7, 3	SG,ST,SHW,WG, WR,WT,WWW	1,5 + 0,75 l	72,60	++	+++	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++	+++	+	- **	1	1	G-10	-
Elatus Era ⁸⁾	150 g/l Prothioconazol+ 75 g/l Benzovindiflupyr	3 7	DI,G,H,R,T,W	(0,8)-1,0	(53,10) - 66,40	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+	-**	1	10	G-10	-
Input Xpro ⁸⁾	250 g/l Spiroxamin + 100 g/l Prothioconazol + 50 g/l Bixafen	5 3 7	DI,G,R,T,W	1,25-1,5 l	66,60 - 79,90	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+	- **	2	-/15/10/5	n.z.	
Revytrex ⁸⁾	66,7 g/l Fluxapyroxad + 66,7 g/l Mefentrifluconazole	7 3	DI,G,R,T,SHW, SWW,WHW, WWW	1,0 l (R,T) 1,5 l (G,W)	51,00 76,40	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+(+)	35	2	1	-	-
Siltra Xpro ^{2,8)}	200 g/l Prothioconazol + 60 g/ha Bixafen	3 7	DI,G,H,R,T,W	0,8-1 l	52,80 - 66,00	++	++(+)	+++	+++	+++	++(+)	++(+)	+++	+++	+	- **	2	G-10	G-10	-
Variano Xpro ⁸⁾	50 g/l Fluoxastrobin* + +100 g/l Prothioconazol+ 40 g/l Bixafen	11 3 7	DI,G,R,T, W	1,25(-1, 5) l 1,5(-1,75) l	82,80 - (99,30) 99,30 - (115,90)	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+	-**	2	10/5/5/1	n.z.	
Zantara ^{2,8)}	166 g/l Tebucoazol+ 50 g/ha Bixafen	3 7	DI,G,R,T,W	1,25-1,5 l	56,10 - 67,00	++	+++	++	+(+)	+++	++	+++	+++++	+++	+	35	1	5	G-10	-

[illegible]

Picolinamide und Kombinationen																			
Univog ^{2,12)}	50 g/l Fenpicoxamid+ 100 g/l Prothioconazol	21 3	DI,R,T,W	1,5-2,0 l	66,10 - 88,10	++(+)	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	-	-**	1	-/-/10/10	G- -/-/10/10	-

Strobilurine* und Kombinationen

Amistar Gold	125 g/l Azoxystrobin + 125 g/l Difenoconazol	11 3	DI,T,W	1,0 l	30,55	(+)	++(+)	++	++	++	++	-	-	-	-	-**	1	10	G-20	-
Amistar Max¹³⁾	93,5 g/l Azoxystrobin + 500 g/l Folpet	11 M4	DI,SG,SH,SR,ST,SWW,WG,WHW,Wr,WT,WWW	1,5 l	27,30	(+)	++(+)	++	(+)	+++	+	++(+)	(+)	(+)	++(+)	-**	1	-15/10/10	n.z.	
Balaya⁹⁾	100 g/l Mefentrifluconazol + 100 g/l Pyraclostrobin	3 11	DI,G,R,SHW,SW W,T,WHW,WWW	1,5 l	75,20	+(+)	+++	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++	+++	+	35	2	5	-	-
Daxur⁶⁾	100 g/l Mefentrifluconazol + 150 g/l Krexoxim-methyl	3 11	DI,G,R,SHW,SW W,T,WHW,WWW	1,0 l	39,00	++(+)	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+	35	1	1	G-10	-
Delaro Forte²⁾	93,3 g/l Prothioconazol + 80 g/l Trifloxystrobin* + 107 g/l Spiroxamin	3 11 5	DI,R,T,SG,WG,W	1,1-1,25 l (1,5 ² l)	39,80 - 43,40 (54,20)	+++	+++	++(+)	++(+)	+++	++(+)	+++	+++	+++	+(+)	-**	2	10/5/5/5	-	-
Fandango	100 g/l Fluoxastrobin* + 100 g/l Prothioconazol	11 3	DI,G,R,T,W	1,25-1,5 l	81,20 - 97,50	+(+)	++(+)	++(+)	++	+++	++(+)	++(+)	+++	+++	+(+)	-**	2	5/5/5/1;5/5/1/1 (Gerste)	G-5	-

Folpan 500 SC	500 g/l Folpet	M4	DI,G,T,W	1,5 l	23,00	-	+	++	-	++	+	+	+	++(+)	42	2	5/5/1/1	n.z.	
Kumar ²⁾	850 g/kg Kaliumhydrogen-carbonat	-	WWW	2,5 kg	47,00	-	++	++	-	-	-	-	-	-	-**	1	1	-	
Multivo	500 g/l Folpet	M4	DI,G,T,W	1,5 l	22,40	-	+	++	-	++	+	+	+	++(+)	42	2	5/5/1/1	n.z.	
Unix	750 g/kg Cyprodinil	9	DI,G,R,T,W	0,6-(1,0) kg	26,90 - (44,90)	+(+) (WG)	-	+	+	+	+	++	+(+)	-	-**	2 (1 R,T)	5/1/1/1	-	5

Is +++: keine bis sehr gute Wirkung rot: Zusatzwirkung

DI-Dinkel, G-Gerste, H-Hafer, R-Roggen, SHW-Sommerhartweizen, T-Triticale, W-Weizen, WH-Winterhafer, WHW-Winterhartweizen, WR-Winterroggen, WWW-Winterweichweizen, EK-Einkorn, EM-Emmer

* Der Pilz *Septoria tritici* ist auch in Österreich bereits regional gegen strobilurinähaltige Wirkstoffe resistent - in Kombinationen wirkt nur der nicht-strobilurinähaltige Partner

** Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsatzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich

*** Die heilende Wirkung gegen Netzfleckenkrankheit ist gering bzw. nicht vorhanden

- 1) ca. Preis 2026 exkl. Mwst., größtes Gebinde
- 2) Zulassung gegen Ährenfusariosen (Kumar: nur bedingt wirksam)
- 3) Regelabstand/50/75/90 % Abtritminderungsklasse
- 4) Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in Meter (je nach Düse kann er unterschiedlich sein) und wenn angegeben ein bewachsener Grünstreifen (mit G und Meterangabe-gekennzeichnet) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtritmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden - außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Unkrautbekämpfung im Nachauflauf, Bodenbedeckung mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchte, rauhes Saatbett, Grünstreifen und Querdämme kann das Risiko reduziert werden.
- 5) FRAC-Einstufung (Fungizid-Wirkungsgruppen): Zur Vermeidung von Resistenzen unterschiedliche Wirkungsgruppen in Mischungen oder Spritzfolgen kombinieren
- 6) Indikation Gelbrost nicht zugelassen
- 7) keine zusätzliche Anwendung mit anderen, diese(n) Wirkstoff(e) enthaltenden Mitteln
- 8) Beim Pilz *Ramularia collo-cygni* in Gerste besteht Resistenzgefahr gegen carboxamidhaltige (SDHI) Fungizide - eine Beimengung eines Kontaktfungizides wird empfohlen.
- 9) Insgesamt nicht mehr als 2 Anwendungen pro Jahr und Kultur mit Pflanzenschutzmitteln, die Wirkstoffe aus der Gruppe der Quinon outside Inhibitoren (Strobilurine; QoI Fungizide) enthalten
- 10) Bei der Anwendung des Mittels muss zu angrenzenden Flächen, die von unbeteiligten Dritten genutzt werden, ein Abstand von mindestens 5 m eingehalten werden.
- 11) Bei der Ausbringung des Mittels muss zum Schutz von unbeteiligten Dritten verlustmindernde Technologie (Abdriftminderungsklasse 50% oder höher gemäß Amtlichen Nachrichten des Bundesamtes für Ernährungssicherheit Nr. 15/2024 – idgF) eingesetzt werden.
- 12) Spe 8 I Bienengefährlich! Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen. Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind. Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden.
- 13) Bei der Anwendung des Mittels muss zu angrenzenden Flächen, die von unbeteiligten Dritten genutzt werden, ein Abstand von mindestens 2 m eingehalten werden. Die Anwendung muss in einer Breite von mind. 20 m zu diesem Randstreifen mit mind. 90 % abdriftmindernder Technik erfolgen.
- 14) Es wird aus resistenzverbergenden Gründen empfohlen, diese Produkte in Kombination mit einem anderen Fungizid auszubringen
- 15) Abkürzung Kulturen (EPPo-Code): DI-Dinkel (3SPEc); EK-Einkorn (TRZMo); EM-Emmer (TRZDI); G-Gerste (3BARC); Getreide (3CERC); H-Hafer (3OATC); R-Roggen (3RYEC); T-Triticale (3TRIC); W-Weizen (3WHEC); SG-Sommergerste (SECCS); SH-Sommerhafer (AVESP); SHW-Sommerhartweizen (TRZDS); ST-Sommertriticale (TTLSo); SHW-Sommerweichweizen (TRZAS); WG-Wintergerste (HORVW); WH-Winterhafer (AVESW); WHW-Winterhartweizen (TRZDW); WR-Winterroggen (SECCW); WT-Wintertriticale (TTLWI); WWW-Winterweichweizen (TRZAW); WDI-Winterdinkel (3SPWC)

Spezialpräparate gegen Mehltau (Auswahl)										
Produkt	Wirkstoffgehalt	Einstufung nach FRAC ⁴⁾	Getreideart ⁷⁾	Menge/ha	ca. Preis/ha ¹⁾ Euro	Wartezeit in Tagen	max. Anzahl der Anwendungen	Abstände zu Oberflächen-gewässern in m ³⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragsgefahr in m ⁴⁾	
Netzschwefel-Kwizda/Stulln²⁾	800 g/kg Schwefel	M2	DI,G,H,R,T,W	7,5 kg	17,00	35	3	1	-	-
Prosper⁶⁾	499 g/l Spiroxamine	5	DI,G,W	0,75-1,5 l	27,40 - 54,80	35	1 (DI,W), 2 (G)	20/10/5/5	n.z.	
Tern	750 g/l Fenpropidin	5	G,H,R,T,W	0,5 l	16,00	42	1 (T), 2 (G,H,R,W)	-20/10/5	G- -20/10/5	-20/10/5
Thiovit Jet	800 g/kg Schwefel	M2	DI,G,H,R,T,W G,R,SWW,T,	7,5 kg	18,60	35	3	1	-	-
Thiopron	825 g/l Schwefel	M2	WWW	7,5 l	49,70	35	2	1	-	-
Vegas/Nissovin	50 g/l Cyflufenamid	U6	DI,G,H,R,T,W	0,2 l	?/13,50	49	2	1	-	-
Präparate mit Halmbruchwirkung (Auswahl)										
(nicht nur gegen Halmbruch wirksam)										
Ascra Xpro	150 g/l Prothioconazol+	3	DI,G,H,R,T,W	1,2-1,5 l	68,70 - 85,90	-*	1	5/1/1/1	G-10	-
	65 g/l Bixafen+ 65 g/l Fluopyram	7								
Daxur	100 g/l Mefentrifluconazol + 150 g/l Krexoxim-methyl	3 11	DI,G,R,SHW, SWW,T,WHW, WWW	1,0 l	39,00	35	1	1	G-10	-
Delaro Forte	93,3 g/l Prothioconazol + 80 g/l Trifloxystrobin + 107 g/l Spiroxamin	3 5 11	WG,WHW, WWW	1,5 l	54,20	-*	2	10/5/5/5	-	-
Fandango	100 g/l Prothioconazol + 100 g/l Fluoxastrobin	3 11	DI,G,R,W	1,25-1,5 l	81,20 - 97,50	-*	2**	5/5/5/1 5/5/1/1 (G)	-	-
Input Classic	160 g/l Prothioconazol+ 300 g/l Spiroxamin	3 5	G,WR,WHW, WWW	1,0-1,25 l	50,30-62,90	-*	2**	5/1/1/1	G-20	-
Input Xpro	250 g/l Spiroxamin + 100 g/l Prothioconazol + 50 g/l Bixafen	5 3 7	DI,W	1,5 l	79,90	-*	2**	-/15/10/5	-	-
Joust	250 g/l Prothioconazol	3	DI,EK,EM	0,8 l	19,10	35	2	1	G-20	-
Siltra Xpro	200 g/l Prothioconazol + 60 g/ha Bixafen	3 7	DI,T,W	1,0 l	66,00	- **	2**	G-10	-	-
Univoq	50 g/l Fenpicoxamid+ 100 g/l Prothioconazol	21 3	DI,T,W	2,0 l	88,10	-*	1	-/-10/10	G- -/-10/10	
Unix	750 g/kg Cyprodinil	9	DI,G,R,T,W	0,6-(1,0) kg	26,90 - (44,90)	42	2**, 1(R,T)	5/1/1/1	-	-
Verben	200 g/l Prothioconazol + 50 g/l Proquinazid	3 13	W, T	0,8 - 1,0 l	42,20 - 52,80	-*	1	5	-	10

1) ca. Preis 2026 exkl. MwSt., größtes Gebinde

2) z.B. Cosan-Super Kolloid-Netzschwefel, Kumulus WG, Microthiol WG, Netzschwefel Kwizda/Stulln; auch im Biolandbau erlaubt

3) Regelabstand/50/75/90 % Abtriftminderungsklasse

4) Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in Meter (je nach Düse kann er unterschiedlich sein) Grünstreifen (mit G und Meterangabe und wenn angegeben ein bewachsener gekennzeichnet) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht reduziert werden - außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Bodenbedeckung mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchte, rauhes Saatbett, Grünstreifen und Querdämme kann das Risiko reduziert werden.

5) FRAC-Einstufung (Fungizid-Wirkungsgruppen): Zur Vermeidung von Resistenzen unterschiedliche Wirkungsgruppen in Mischungen oder Spritzfolgen kombinieren

* Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich

** gegen Halmbruch nur einmal einsetzbar

6) anwendbar bis 5.8.2026

7) Abkürzung Kulturen (EPPO-Code): DI-Dinkel (3SPEC); EK-Einkorn (TRZMO); EM-Emmer (TRZDI); G-Gerste (3BARC); Getreide (3CERC); H-Hafer (3OATC); R-Roggen (3RYEC); T-Triticale (3TRIC); W-Weizen (3WHEC); SG-Sommergerste (SECCS); SH-Sommerhafer (AVESP); SHW-Sommerhartweizen (TRZDS); ST-Sommertriticale (TTLSo); SWW-Sommerweichweizen (TRZAS); WG-Wintergerste (HORVW); WH-Winterhafer (AVESW); WHW-Winterhartweizen (TRZDW); WR-Winterroggen (SECCW); WT-Wintertriticale (TTLWI); WWW-Winterweichweizen

7) Abkürzung Kulturen (EPPO-Code): DI-Dinkel (3SPEC); EK-Einkorn (TRZMO); EM-Emmer (TRZDI); G-Gerste (3BARC); Getreide (3CERC); H-Hafer (3OATC); R-Roggen (3RYEC); T-Triticale (3TRIC); W-Weizen (3WHEC); SG-Sommergerste (SECCS); SH-Sommerhafer (AVESP); SHW-Sommerhartweizen (TRZDS); ST-Sommertriticale (TTL SO); SWW-Sommerweichweizen (TRZAS); WG-Wintergerste (HORVW); WH-Winterhafer (AVESW); WHW- Winterhartweizen (TRZDW); WR-Winterroggen (SECCW); WT- Wintertriticale (TTLW1); WWW-Winterweich

Getreide-Insektizide (Auswahl)

Produkt	Wirkstoff	Einstufung nach IRAC ⁵⁾	Schaderreger	Zulassung ⁶⁾	Aufwandsmenge je ha	Preis/ha ¹⁾ Euro	Wartezeit in Tagen	Bienengefährlichkeit ⁴⁾	Abstände zu Oberflächengewässern in m ²⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragsgefahr in m ⁴⁾	
Synthetische Pyrethroide											
Cymbigon Forte	Cypermethrin	3A	saugende Insekten (ES 10-51) Getreidehähnchen	WG, WH, WHW, WWW, WR, WT, DI; SG, SH, SHW, SWW, SR, ST	50 ml	2,90	-* 28	SPe 8*	-/-/15/10 (So-Getr.); -/-/20/10 (Wi-Getr.)	-/-/15/10 (So-Getr.) n.z. (Wi-Getr.)	
Decis Forte	Deltamethrin	3A	Blattläuse als Virusvektoren; Blattläuse; Getreidehähnchen	WG, WH, WHW, WWW; DI, G, H, W; DI, G, H, R, T, W	62,5 ml; 50 ml; 75 ml	5,70 4,60 6,80	30	SPe 8*	-/-/15/5 /-/-10/5 15/5/5/5	15/10/5/5	-
Delta Super	Deltamethrin	3A	Getreidehähnchen, Getreidewickler	DI, G, H, R, T, W	300 ml	4,50	28	SPe 8	-/-/30/15	-	-
Karate Zeon	Lambda-Cyhalotrin	3A	beißende Insekten, saugende Insekten; Zweiflügler, Fritfliege	DI, G, R, T, W	75 ml	9,50	28	SPe 8	-/10/5/5	-	-
Mavrik Vita/Evure	Tau-Fluvalinat	3A	Blattläuse; Blattläuse als Virusvektoren	DI, G, H, R, T, W	0,2 l	15,00	-* in Mischungen mit Azolen	SPe 8	-/-/15/10	-	-
Nexide ⁷⁾	Gamma-Cyhalotrin	3A	beißende Insekten, saugende Insekten	DI, G, H, R, T, W	80 ml	?	35	SPe 8	-/-/-/15	G---/-/-/20	-
Sumi-Alpha/ Sumicidin Top	Esfenvalerate	3A	beißende Schädlinge saugende Schädlinge	Getreide	0,2 l 0,15 l	5,60 4,20	35	SPe 8*	10	-	-
Sonstige Wirkstoffe											
Afinto	Flonicamid	9C	Blattläuse	G, H, T, R, WWW	140 g	27,80	28	SPe 8	1	-	-
Carnadine	Acetamiprid	4A	Haferblattlaus, Große Getreideblattlaus, Blattläuse	WWW, WHW, WT, WG, ST, SR, Einkorn, Emmer, Rauweizen	0,15 l	11,60	28	SPe 8*	1 bzw. in WG, WHW, WT 5	G-10 bei WG, WHW, WT, WWW	
Pirimor Granulat	Pirimicarb	1A	Blattläuse	DI, G, H, R, T, W	200-300 g	17,90 - 25,90	35	-	-/-/-/20	n.z.	
Tepeki	Flonicamid	9C	Blattläuse	WWW	140 g	27,80	28	SPe 8	1	-	-

1) unverb. empf. Listenpreise 2026 exkl. Mwst, größte Verpackungseinheit

2) Regelabstand/50/75/90 % Abtriftminderungsklasse

3) Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in Meter (je nach Düse kann er unterschiedlich sein) und wenn angegeben ein bewachsener Grünstreifen (mit G und Meterangabe gekennzeichnet) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden - außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Unkrautbekämpfung im Nachauflauf, Bodenbedeckung mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchte, rauhes Saatbett, Grünstreifen und Querdämme kann das Risiko reduziert werden.

4) **SPe 8***: Bienengefährlich! - Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen. Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind. Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden.

SPe 8: Bienengefährlich!-Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen. Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind.

Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden. Im Fall von Anwendungen in blühenden Kulturen darf die Anwendung nur nach dem Ende des täglichen Bienenflugs bis 23 Uhr erfolgen - keine Einstufung (nicht bienengefährlich)

5) IRAC-Einstufung (Wirkungsmechanismus): Zur Vermeidung von Resistenzen unterschiedliche Wirkungsmechanismen verwenden

-* Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich

6) Abkürzung Kulturen (EPPO-Code): DI-Dinkel (3SPEC); EK-Einkorn (TRZMO); EM-Emmer (TRZDI); G-Gerste (3BARC); Getreide (3CERC); H-Hafer (3OATC); R-Roggen (3RYEC); Rauweizen (TRZTU); T-Triticale (3TRIC); W-Weizen (3WHEC); SG-Sommergerste (SECCS); SH-Sommerhafer (AVESP); SHW-Sommerhartweizen (TRZDS); ST-Sommertriticale (TTLSO); SWW-Sommerweichweizen (TRZAS); WG-Wintergerste (HORVW); WH-Winterhafer (AVESW); WHW-Winterhartweizen (TRZDW); WR-Winterroggen (SECCW); WT-Wintertriticale (TTLWI); WWW-Winterweichweizen (TRZAW); WDI-Winterdinkel (3SPWC)

7) bis 30.9.2026 zu verbrauchen

Wachstumsregler im Getreidebau

Produkt	Wirkstoffgehalt	Aufwandmenge/ ha	ca. Preis/l ¹⁾	Kulturen ³⁾	Wartefrist in Tage	Abstände Oberflächen- gewässer in m ²⁾
Calma/Trimaxx	175 g/l Trinexapac	bis 0,8 l*	?/ ?	WG, WHW, WWW, WR, WT	-**	1
Cerone 480 SL	480 g/l Etephon	bis 1,5 l*	31,90	DI,R,SG,SHW,SWW,WG,WHW,WT,WWW	-**	1
Countdown NT	222 g/l Trinexapac	bis 0,8 l*	27,60	DI, G, Gräser, H, HW, R, SWW, TR, WWW	-**	1
Fabulis OD	50 g/l Prohexadion-Calcium	bis 1,5 l*	42,50	WG, WHW, WWW, R, SG, TR	-**	1
Grassrooter	480 g/l Etephon	bis 1,0 l*	20,30	SG, WG, WHW, WT, WWW	-**	1
Medax Top + Turbo	300 g/l Mepiquat-Chlorid+	bis 1,5 l*+	?	DI, TR, WG, WR, WWW	-**	1
	50 g/l Prohexadion-Calcium	bis 1,5 l Turbo*				
Modan 250 EC	222,2 g/l Trinexapac	bis 0,6 l/ha*	29,40	H,G, R,TR,WWW	-**	1
Moddus	222 g/l Trinexapac	bis 0,8 l*	50,60	DI, G, Gräser, H, HW, TR, W-Raps, WR, WWW	-**	1
		(Raps bis 1,5 l)				
Moxa/Tridus	222,5 g/l Trinexapac	bis 0,6 l*	28,40/32,20	DI, G, Gräser (0,8 l/ha); H, HW, R, SWW, TR, WWW	-**	1
Next	222,2 g/l Trinexapac	bis 0,8 l*	30,20	G, WWW	-**	1
Palermo 720	558,33 g/l Chlormequat	bis 2,08 l*	10,70	G, H, R, SHW, SWW, TR, WHW, WWW	-**	1
	50 g/l Prohexadion-Calcium+					
Prodax	66,7 g/l Trinexapac	bis 1,0 kg*	56,00	DI, G, H, SHW; SWW, WHW, WR, WWW, WT	-**	1
Regulator 720	558,33 g/l Chlormequat	bis 2,08 l*	6,30	G, H, R, SHW, SWW, TR, WHW, WWW	-**	1
Stemper	155,6 g/l Trinexapac	bis 0,8 l*	?	WG,WHW,WR,WT,WWW; Einkorn, Emmer, Khorasan-W.	-**	1
Stabilan 400	310,4 g/l Chlormequat	bis 6 l*	33,30	DI, G, H, R, SHW, SWW, TR, WHW, WWW	42-63*	1

*je nach Kultur und Zulassung

**Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (zB Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.

1) ca. Preis 2026, exkl. Mwst, größtes Gebinde, durchschnittliche Rabatte

2) Regelabstand/50/75/90 % Abtriftminderungsklasse

6) Abkürzung Kulturen (EPPO-Code): DI-Dinkel (3SPEC); EK-Einkorn (TRZMO); EM-Emmer (TRZDI); G-Gerste (3BARC); Getreide (3CERC);

Khorasan-Weizen (TRZTN); T-Triticale (3TRIC); W-Weizen (3WHEC); SG-Sommergerste (SECCS); SH-Sommerhafer (AVESP);

SHW-Sommerhartweizen (TRZDS); ST-Sommertriticale (TTLSO); SWW-Sommerweichweizen (TRZAS); H-Hafer (3OATC); R-Roggen (3RYEC);

Rauweizen (TRZTU); WG-Wintergerste (HORVW); WH-Winterhafer (AVESW); WHW- Winterhartweizen (TRZDW); WR-Winterroggen (SECCW);

WT- Wintertriticale (TTLWI); WWW-Winterweichweizen(TRZAW); WDI-Winterdinkel (3SPWC)

Herbizide in Mais (ZEAMAX) - Aufwandmengen und Wirkungsspektren (Auswahl)

Produkt	Wirkstoff(e)	Einstufung nach HRAC ³⁾ neu alt		Aufwandmenge pro ha	Amaranth	Gänsefußgewächse	Kamille	Schw. Nachtschatten	Klettenlabkraut	Knötericharten	Franzosenkraut	Ehrenpreisarten	Ackerdistel	Ackerwinde	Hirsearten	Quecke	Preise EUR/ha ¹⁾	Abstände zu Oberflächen-gewässern in m ²⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragungsgefahr in m ⁴⁾	
Vorauslauf bzw. früher Nachauflauf																				
Adengo ⁶⁾	Isoxaflutole +Thiencarbazone +Cyprosulfamide	27,2	F2,B	0,44 l	+++	++(+)	+++	+++	++(+)	+++	+++	+++	+	+	+++	+	72,15	5/5/1/1	-	10
Aspect Neo	Dimethenamid-p + Terbuthylazin	15,5	K3,C1	2 l	+++	++(+)	+++	++	+	++	+++	+++	-	-	+++	-	?	15/10/5/1	n.z.	
Aspect Pro ^{8,12)}	Flufenacet + Terbuthylazin	15,5	K3,C1	1,5-2,25 l	+++	++(+)	+	+(+)	++(+)	++	++	+++	-	-	+++	-	37,60 - 46,30	10/5/3/1	-	20
Stomp Aqua	Pendimethalin	3	K1	3,5 l	+++	+++	++	++	++	++	-	+++	-	-	++	-	77,00	20/20/10/5	G-5	20/20/10/5
Spectrum/ Star Dimethenamid-p	Dimethenamid-p	15	K3	1,25 l	++	+(+)	++	++	+	+(+)	++	++	-	-	+++	-	53,40	20/10/5/5 (1,3-1,4 l/ha); 15/10/5/5 (0,9-1,2 l/ha)	-	-
Spectrum Gold ⁸⁾	Dimethenamid-p + Terbuthylazin	15,5	K3,C1	2 l	+++	++(+)	+++	++	+	++	+++	+++	-	-	+++	-	45,40	15/10/5/1	n.z.	
Spectrum Plus / Wing P (alle nur VA)	Dimethenamid-p + Pendimethalin	15,3	K3,K1	3-4 l	+++	+++	++	++	++	++	++	+++	-	-	+++	-	68,50 - 91,30	-/15/15/5	G- -/15/15/10	
Successor 600	Pethoxamid	15	K3	2 l	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+++	-	68,30	15/10/5/1	n.z.	
Successor TX ⁹⁾	Pethoxamid + Terbuthylazin	15,5	K3,C1	4 l	++	++(+)	++	++	++	++	++(+)	+++	-	-	+++	-	74,60	-/15/5/5	n.z.	
Nachauflauf (fast keine Bodenwirkung)																				
- ALS-Hemmer, Sulfonylharnstoffe																				
Fornet ^{5,9)}	Nicosulfuron	2	B	0,75 l	+++	++	++	+	++	+	+	+	+	(+)	++(+)	++(+)	23,90	5/5/1/1	G-20	
Dragster + Vivolt	Rimsulfuron + Thifensulfuron + NM	2	B	135 g + 0,4 l; 2 x 67,5 g + 2 x 0,2 l; 85g + 0,2 l + 50 g + 0,2 l	+++	++(+)	+++	-	++(+)	+++	+++	-	+++	++	++(+)	++(+)	38,40	20	G-20 G-10 G-10	
		2	B	0,8-1,0 l	+++	++	++	+	++	+	+	+	+	(+)	++(+)	++(+)	?	5/5/1/1	G-20	-
Nicogan ^{5,10)}	Nicosulfuron	2	B	0,8-1,0 l	+++	++	++	+	++	+	+	+	+	(+)	++(+)	++(+)	7,40 - 9,30	1	n.z.	
Nicorn 040 SC	Nicosulfuron	2	B	0,8-1,0 l	+++	++	++	+	++	+	+	+	+	(+)	++(+)	++(+)	7,40 - 9,20	5	G-15	-
Nicosh 4 OD ⁵⁾	Nicosulfuron	2	B	0,8-1,0 l	+++	++	++	+	++	+	+	+	+	(+)	++(+)	++(+)	31,70 - 57,00	10/5/5/1	-	-
Monsoon	Foramsulfuron	2	B	1,5-2,7 l	+++	++	++	+++	++	++	+++	-	+	-	++(+)	++(+)				
SL 950 ¹⁰⁾ /Primero	Nicosulfuron	2	B	0,8-1,0 l	+++	++	++	+	++	+	+	+	+	(+)	++(+)	++(+)	15,60 - 19,50/11,40-14,20	5/1/1/1	n.z.	
Titus + Neowett	Rimsulfuron	2	B	30 - 40 g + 0,2 l	+++	+	+++	-	++(+)	++	++	-	+	(+)	++(+)	++(+)	36,00 - 45,90	1	-	-
Harmony SX + Netzmittel	Thifensulfuron Foramsulfuron+ Iodosulfuron	2	B	7,5-15 g + 0,1 %	+++	++(+)	+++	-	++	++	+++	-	+	++(+)	-	-	26,30 - 40,50	1	-	-
MaisTer Power	+Thiencarbazone-methyl +Cyprosulfamide	2	B	1,5 l; 2 x 0,75 l	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++(+)	++	+++	+++	+++	++(+)	83,10	10 5	n.z.	

Herbizide in Mais (ZEAMAX) - Aufwandmengen und Wirkungsspektren (Auswahl)

Produkt	Wirkstoff(e)	Einstufung nach HRAC ³⁾ neu alt	Aufwandmenge pro ha	Amaranth	Gänsefußgewächse	Kamille	Schw. Nachtschatten	Klettenlabkraut	Knötericharten	Franzosenkraut	Ehrenpreisarten	Ackerdistel	Ackerwinde	Hirsearten	Quecke	Preise EUR/ha ¹⁾	Abstände zu Oberflächen- gewässern in m ²⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragsgefahr in m ⁴⁾	
<i>- Triketone (HPPD-Hemmer)</i>																			
Botiga	Mesotrione + Pyridate	27,6	F2, C3	1 l	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	++	-	++(+)	-	?	1	G-10	-
Callisto	Mesotrione	27	F2	0,8-1	+++	+++	+++	+++	++(+)	++	+++	++	-	++	-	20,50 - 25,60	1	G-20	-
Laudis	Tembotrione + Isoxadifenethyl (Safener)	27	F2	1,5-2,25 l	+++	+++	++	+++	++	++(+)	+++	(+)	++	-	+++	62,30 - 93,40	5/1/1/1	G-20 (2,25 l) G-10 (1,15 l)	-
Raikiri	Mesotrione	27	F2	1 l	+++	+++	+++	+++	++(+)	++	+++	+++	-	++	-	17,32	1	n.z.	
<i>- andere Wirkstoffe</i>																			
Casper + NM (bei Soloeinsatz)	Dicamba + Prosulfuron	4,2	O,B	0,3 kg + NM	++(+)	++(+)	+++	+	++(+)	+++	++(+)	+	+++	+++	-	26,10	1	G-15	-
Cliphar 600 SL	Clopyralid	4	O	0,2 l	-	-	+++	++(+)	-	(+)	+++	-	+++	-	-	62,30	1	-	-
Lontrel 720 SG ¹¹⁾ + Gondor (NM)	Clopyralid	4	O	167 g + 0,5 l	-	-	+++	++(+)	-	(+)	+++	-	+++	-	-	72,50	1	-	-
Dicamba flüssig/Dicash/Janer o 480 SL/Kwizda Dicamba/Maisban- vel flüssig/Joker 480/Delion	Dicamba	4	O	0,4-0,6 l	++	++(+)	++	+	+++	++	++	+	+++	+++	-	12,50 - 18,80 9,90 - 14,90 8,60 - 12,90 11,70 - 17,60 11,50 - 17,20 8,90 - 13,50 12,40 - 18,60	1	-	-
Mais-Banvel WG/Oceal	Dicamba	4	O	0,3-0,41 kg	++	++(+)	++	+	+++	++	++	+	+++	+++	-	21,50 - 29,30/ 14,70 - 20,10	1	-	-
Onyx	Pyridate	6	C3	1,5 l; 2 x 0,75 l	+++	++(+)	+(+)	+++	+++	+	++(+)	+	(+)	(+)	-	75,20	10/5/5/5 (1,5 l) 5 (0,75 l)	G 15 (1,5 l) G10 (0,75 l)	-

Herbizide in Mais (ZEAMAX) - Aufwandsmengen und Wirkungsspektren (Auswahl)

Produkt	Wirkstoff(e)	Einstufung nach HRAC ³⁾		Aufwandmenge pro ha	Amaranth	Gänsefußgewächse	Kamille	Schw. Nachtschatten	Klettenlabkraut	Knötericharten	Franzosenkraut	Ehrenpreisarten	Ackerdistel	Ackerwinde	Hirsearten	Quecke	Preise EUR/ha ¹⁾	Abstände zu Oberflächen-gewässern in m ²⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragungsgefahr in m ⁴⁾	
		neu	alt																	
Kombinationen, Kombipackungen																				
1.) Voraufbau bis in den Auflauf der (kleinen) Unkräuter, feuchter Boden;bis 3-Blattstadium Mais																				
Adengo	Isoxaflutole +Thiencarbazon +Cyprosulfamide	27,2	F2,B	0,44 l	+++	++(+)	+++	+++	++(+)	+++	+++	+++	+	+	+++	+	72,10	5/5/1/1	-	10
2.) früher Nachaufbau, Unkräuter und Mais max. 4 Blätter blatt- und bodenaktive Komponenten in etwa gleichrangig trockene Anwendungsbedingungen, in späterer Folge Niederschläge																				
Dragster Mais Pack (Dragster + Bozon + Quantum + Vivolt)	Rimsulfuron + Thifensulfuron + Mesotrione + Pethoxamid +NM	2,27,15	B,F2,K 3	135 g +1 + 1,25 + 0,4 l	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	++	++(+)	++(+)	90,20	20		n.z.
Elumis ⁹⁾ Profi Pack (Elumis + Dual Next + Mais Banvel WG)	Mesotrione + Nicosulfuron + Pethoxamid + Dicamba	27,2,15 ,4	F2,B,K 3,O	1,25 l + 2 l + 250 g	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	+++	+++	++(+)	90,80	15/10/5/1		n.z.
Elumis ^{8,9)} Profi TX Pack (Elumis + Successor TX + Mais Banvel WG)	Mesotrione + Nicosulfuron + Pethoxamid + Terbuthylazin + Dicamba	27,2,15 ,5,4	F2,B,K 3,C1,O	1,25 l + 2 l + 250 g	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++(+)	83,30	-/15/5/5		n.z.
Elumis Xpert ⁹⁾ (Elumis ⁹⁾ + Campus + Peak)	Mesotrione + Nicosulfuron + Dimethenamid-p + Prosulfuron Tembotrione	27,2,15 ,2	F2+B+ K3+B	1,25 l + 1,25 l + 20 g	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++(+)	+++	++	+++	++(+)	96,20	15/10/5/5	G-20	-
Laudis + Aspect Pro ⁸⁾	+Terbuthylazin +Flufenacet	27,5,25	F2,C1, K3	1,5 + 1,5 l	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	(+)	+++	(+)	95,60	10/5/3/1	G-20	-
Laudis Profi + Spectrum + Mero	Tembotrione +Thiencarbazon +Dimethenamid-p	27,2,15	F2,B,K 3	250 ml +1,0+2,0 l	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+	++	++	+++	+	107,20	15/10/5/5	G-10	-
Maistro (Talisman + Bozon + Successor 600)	Nicosulfuron + Mesotrione + Pethoxamid Nicosulfuron +Rimsulfuron +Mesotrione	2,27,15	B,F2,K 3	1 +1 1,25 l	+++	+++	+++	+++	+++	++(+)	+++	++	++	+	++(+)	++(+)	72,80	15/10/5/1		n.z.
Omega Gold Pack ⁸⁾ (Arigo + Spectrum Gold + Neowett)	+Dimethenamid-p + Terbuthylazin	2,27,15 ,5	B,F2,K 3,C1	250 g + 2 l + 0,4 l	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	+	+++	+++	92,20	15/10/5/1		n.z.
WS 600 (Talisman + Border + Successor 600)	Nicosulfuron + Mesotrione + Pethoxamid	2,27,15	B,F2,K 3	1,0 + 1,0 + 1,25 l	+++	+++	+++	+++	+++	++(+)	+++	++(+)	++	+	+++	+++	?	15/10/5/1		n.z.
3.) Nachaufbau, Unkräuter 2-6 Blätter, Mais 4* bis 6 Blätter blattaktive Komponente im Vordergrund (Hirsewirkung fast nur über's Blatt)																				

Herbizide in Mais (ZEAMAX) - Aufwandsmengen und Wirkungsspektren (Auswahl)

Produkt	Wirkstoff(e)	Einstufung nach HRAC ³⁾		Aufwandmenge pro ha	Amaranth	Gänsefußgewächse	Kamille	Schw. Nachtschatten	Klettenlabkraut	Knötericharten	Franzosenkraut	Ehrenpreisarten	Ackerdistel	Ackerwinde	Hirsearten	Quecke	Preise EUR/ha ¹⁾	Abstände zu Oberflächen-gewässern in m ²⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragsungsgefahr in m ⁴⁾	
		neu	alt																	
Laudis Profi/ Capreno+Mero	Tembotrione +Thiencarbazone	2,27	B,F2	0,25 l + 2 l	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+(+)	++	++	+++	+	64,40	5/1/1/1	G-10	-
Laudis Profi Plus (Capreno + Delion + Mero)	Tembotrione +Thiencarbazone + Dicamba	2,27,4	B,F2,O	0,25 + 0,33 + 1,5 l	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+(+)	+++	+++	+++	+	62,30	5/1/1/1	G-10	-
CB Maispack (Botiga + SL 950 ¹⁰⁾)	Mesotrione + Pyridate + Nicosulfuron	27,5,2	F2,C3, B	1 l + 1 l	+++	+++	+++	+++	+++	++(+)	+++	++	++	+	+++	++(+)	52,70	5/1/1/1	n.z.	
Diniro + Adigor	Nicosulfuron+Dicamba+Prosulfuron	2,4,2	B,O,B	400 g + 1,2 l	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+(+)	+++	++(+)	++(+)	50,10	5/1/1/1	n.z.	
Elumis Peak Pack (Elumis + Peak)	Mesotrione + Nicosulfuron + Prosulfuron	27,2	F2,B	1,25 l + 20 g	++(+)	+++	+++	++(+)	++(+)	+++	++(+)	++(+)	+++	+++	+++	++	53,30	5/5/1/1	G-20	-
Kaltor Mais Pack (Cuter + Kaltor ⁹⁾ + Connector)	Mesotrione + Dicamba + Nicosulfuron + Aktivator	27,4,2	F2,O,B	1,0 l + 0,25 kg + 0,5 l	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++	+++	++(+)	43,20	10/5/5/1	n.z.	
Kwizda Mais Pack (Barracuda + Talisman + Mural)	Mesotrione + Nicosulfuron + Dicamba	27,2,4	F2, B, O	1 l + 1 l + 0,4 l	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++	+++	++(+)	50,40	5/1/1/1	n.z.	
Laudis Monsoon Plus (Laudis + Monsoon + Delion)	Tembotrione + Foramsulfuron + Dicamba	27,2,4	F2,B,O	1,25-1,5 + 1,25-1,5 + 0,45-0,6	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+(+)	+++	+++	+++	+++	75,00 - 91,60	10/5/5/1	G-20	-
MaisTer Power	Foramsulfuron + Iodosulfuron + Thiencarbazone-methyl + Cyprosulfamide	2	B	1,5 l; 2 x 0,75 l	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++(+)	++	+++	+++	+++	++(+)	83,10	10	n.z.	
MaisTer Power Plus (MaisTer Power + Delion)	Foramsulfuron + Iodosulfuron + Thiencarbazone-methyl + Dicamba + Cyprosulfamide	2,4	B,O	1,5 + 0,45 l	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++(+)	++	+++	+++	+++	++(+)	90,30	10	n.z.	
Valentia Maispack (Valentia + Raikiri + Ikanos)	Fluroxypyr + Florasulam + Mesotrione + Nicosulfuron	4,2,27, 2	O,B,F2, B	1 l + 1 l + 1 l	+++	+++	+++	+++	+++	++(+)	+++	++	+++	+++	+++	++(+)	51,80	10/5/5/1	n.z.	

Legende

1) Preise 2026, exkl. Mwst., größtes Gebinde

2) Regelabstand/50/75/90 % Abtriftminderungsklasse (m)

3) Klassifizierung des Wirkungsmechanismus; Resistenzvermeidung durch Verwendung von Produkten aus verschiedenen Gruppen

4) Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in Meter (je nach Düse kann er unterschiedlich sein) und wenn angegeben auch ein bewachsener Grünstreifen (mit G und Meterangabe-gekennzeichnet) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden - außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Unkrautbekämpfung im Nachauflauf, Bodenbedeckung mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchte, rauhes Saatbett, Grünstreifen und Querdämme kann das Risiko reduziert werden.

5) Anwendung von Mitteln mit dem Wirkstoff Nicosulfuron nur alle 2 Jahre auf der selben Fläche.

6) bis zum 3-Blattstadium des Mais, Mindestsaattiefe 4 cm

7) gute Wirkung bei Zaunwinde, Teilwirkung bei Ackerwinde

8) Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode, wobei die Anwendung nur alle 3 Jahre auf derselben Fläche erfolgen darf. Keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen Mitteln, die den Wirkstoff Terbutylazin enthalten.

9) Insgesamt nicht mehr als eine Anwendung, auch keine zusätzliche Anwendung mit anderen Mitteln, die den Wirkstoff Nicosulfuron enthalten

10) maximale Aufwandmenge 40 g Wirkstoff pro Hektar und Jahr auf derselben Fläche; darf - auch in Kombination mit anderen diesen Wirkstoff enthaltenden Pflanzenschutzmitteln - nicht überschritten werden

11) Spritzen als Teilflächenbehandlung

12) zu verbrauchen bis 10.12.2026

Produkte mit dem Wirkstoff Terbutylazin dürfen in Wasserschutz- und Schongebieten (<http://doris.ooe.gv.at/fachinfo/wasser/>) nicht eingesetzt werden

Bei der Teilnahme am ÖPUL-Programm "Vorbeugender Grundwasserschutz-Acker 2023" dürfen Produkte mit den Wirkstoff Terbutylazin nicht verwendet werden.

Herbizide in Soja (GLXMA) - Aufwandmengen und Wirkungsspektren

Produkt	HRAC Einstufung ⁹⁾ alt	neu	Aufwand- menge/ha	Anaranth	Gänsefußgewäc- hse	Kamille	Schwarzer Nachtschatten	Klettenlabkraut	Knötericharten	Franzosenkraut	Ehrenpreisarten	Distel	Hirsearten	Preise EUR/ha ¹⁾	Abstände zu Oberflächen- gewässern ²⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragsgefahr in m ³⁾
Voraufbau																
Centium CS*, Ciomate*, Command 36 CS*, Reactor*	13	F4	0,25 l	++	++	+	+(+)	+++	+	+++	+	-	-	54,60/16,80/28,40/22,30	1	-
Chanon	34	F4	1,5 l	++	++(+)	+(+)	+	++	++	++	++(+)	-	+(+)	38,20	-/15/10/5	n.z.
Conaxis	15,13	K3,F4	1,5 l	+++	++	+++	++	+++	++	+++	+++	-	+++	57,70	1	G-10
Lentipur 500 ¹²⁾	5	C2	2-2,5 l/ha	+++	+	+++	-	-	-	-	-	-	-	25,00-31,20	1	G-5
Proman	5	C2	2-3 l	++(+)	++(+)	++(+)	+(+)	+	++	++	+(+)	-	+(+)	69,40 - 104,10	5/1/1/1	n.z.
Soja-Pack (Successor 600* + Reactor*)	15,13	K3,F4	2 + 0,25 l	+++	++	+++	+(+)	+++	+(+)	+++	+	-	+++	81,20	15/10/5/1	n.z.
Spectrum/Star Dimethenamid-p	15	K3	1,0-1,4 l	++	+(+)	++	++	+	+(+)	++	++	-	+++	42,50 - 59,50/39,40-55,10	15/10/5/5 (1,0 l) 20/10/5/5 (1,4 l)	G-20
Spectrum plus ^{a9)} /Wing P ⁹⁾	3,15	K1, K3	2,5 l	+++	+++	++	++	++	++	++(+)	+++	-	+++	57,10/50,70	-/15/15/5	G- -/15/15/5
Stomp Aqua ⁹⁾	3	K1	1,5 l	+++	+++	++	++	++	++	-	+++	-	++	33,00	15/10/5/5	-
Successor 600*	15	K3	2,0 l	++	+	++	+	+	+	++	+	-	+++	68,30	15/10/5/1	n.z.
Nachaufbau																
Pulsar 40 ^{4,10)}	2	B	0,75 -(1,25) l	+++ ⁸⁾	++(+) ⁸⁾	++	+++	++	++(+)	+++	++	++	++	33,00 - (54,90)	1	-
Pulsar Plus ^{10,12)}	2	B	2 x 0,8-1,0 l	+++ ⁸⁾	++(+) ⁸⁾	++	+++	++	++(+)	+++	++	++	++	56,40 - 70,60	1	-
Harmony SX*-Splitting oder	2	B	2 x 7,5 g + 0,1% Optiwett CS-7	+++ ⁸⁾	+++ ⁸⁾	+++	-	++	++	+++	+	+(+)	-	47,10	1	-
1. Behandlung: Harmony SX + Pulsar Plus ^{10,12)} + 0,1% Optiwett CS 7	2	B	7,5 g + 0,8 l + 0,1% Optiwett CS	+++ ⁸⁾	+++ ⁸⁾	+++	+++	+++	++	+++	++	++	-	52,30	1	-
2. Behandlung: Harmony SX + Pulsar Plus ^{10,12)} + 0,1% Optiwett CS 7	2	B	7,5 g + 0,8 l + 0,1% Optiwett CS											52,30	1	-
Gräserherbizide																
Agil S*	1	A	0,75 - 1,0 l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	22,50 - 23,00	1	-
Focus Ultra	1	A	1,5 -2 l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	46,00 - 61,30	1	-
Fusilade Max*	1	A	1 l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	28,60	1	n.z.
Targa super/Maceta 100	1	A	0,5 l + 2 l Öl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	45,40/32,60	1	-
Legende 1) Preise 2026, exkl. Mwst., größtes Gebinde 2) Regelabstand/50/75/90 % Abtriftminderungsklasse (m) 3) Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in Meter (je nach unterschiedlich sein) und wenn angegeben ein bewachsener Grünstreifen (mit G und Meterangabe gekennzeichnet) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden - außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Unkrautbekämpfung im Nachaufbau, Bodenbedeckung mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchte, rauhes Saatbett, Grünstreifen und Querdämme kann das Risiko reduziert werden. 4) Pulsar 40 kann entweder bei der ersten oder bei der zweiten Anwendung von Harmony SX beigemischt werden, ein Splitting ist nicht erlaubt 5) Klassifizierung des Wirkungsmechanismus; Resistenzvermeidung durch Verwendung von Produkten aus verschiedenen Gruppen 7) nicht triazinresistent 8) nicht ALS-resistent 9) kein Einsatz in den Sorten Cypress, ES Comandor 10) Anwendung nur alle 3 Jahre auf derselben Fläche. Keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen Mitteln, die den Wirkstoff Imazamox enthalten 11) 12) Notfallzulassung gem. Art. 53 VO (EG) Nr. 1107/2009 vom 1.4.-20.7.2026 genehmigt * Schäden, einschl. Ertragsminderung, a. d. Kultur möglich; mögliche Schäden a. d. Kultur liegen im Verantwortungsbereich d. Anwenders.																

+++ sehr gut wirksam

++ gut wirksam

+ schwach/nur im Wachstum gehemmt

- keine Wirkung

rot: Zusatzwirkung

Wirkung von Herbiziden auf Leitunkräuter in Winterraps (BRSNW) (Auswahl)

Mittel	Wirkstoff(e)	HRAC-Einstufung ⁶⁾		Aufwand-menge je ha	Preis/ha ¹⁾ EUR	Anwendungszeit (BBCH Stadien)	Kleintabkraut	Kamille	Vogelmiere	Taubnessel	Ehrenpreis	Besenrauke	Hirtentäschel, Hellerkraut	Ackerstiefmütterchen	Klatschmohn	Ausfallgetreide	Abstände zu Oberflächen-gewässern in m ²⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragungsgefahr in m ³⁾	
		neu	alt																
Devrinol	Napropamide	15	K3	2,5 l	72,60	VSE	+(+)	+++	+++	+	++	-	+(+)	+	+	++	5	-	-
Naprop 450	Napropamide	15	K3	2,5 l	76,60	VSE, VA	+(+)	+++	+++	+	++	-	+(+)	+	+	++	5	-	-
Centium CS	Clomazone	13	F4	0,25-0,3 l	54,60 - 65,50	VA	+++	-	+++	+++	+	+	+++	+	+	(+)	1	-	-
Clomate	Clomazone	13	F4	0,33 l	22,20	VA bis 5 Tage n.d.Saat/VA	+++	-	+++	+++	+	+	+++	+	+	(+)	1	-	-
Colzor Trio ⁵⁾	Dimethachlor +Napropamide +Clomazone	13,13,15	K3,K3,F4	3-4** l	93,40-120,60	VA	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	+	++	+(+)	15/10/5/1	-	-
Conaxis ¹¹⁾	Clomazone + Dimethenamid-p	13,15	F4,K3	1,25	48,10	VA	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	+(+)	++	(+)	1	G-10	-
Nero	Pethoxamid +Clomazone	15,13	K3,F4	3,0 l	125,50	VA bis 5 Tage n.d.Saat	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	++	++	(+)	50/20/10/5	G-10	50/20/10/10
Nero + Centium CS**	Pethoxamid +Clomazone	15,13	K3,F4	3,0 l + 50 ml	137,10	VA bis 5 Tage n.d.Saat	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	++	++	(+)	50/20/10/5	G-10	50/20/10/10
Reactor/Reactor 360 CS	Clomazone	13	F4	0,33 l	29,40/32,10	VA bis 5 Tage n.d.Saat	+++	-	+++	+++	+	+	+++	+	+	(+)	1	-	-
Butisan ⁴⁾	Metazachlor	15	K3	1,5 l	46,60	VA, NA 10-12	*)	+++	+++	++	++	+	****)	+	++	+	5/5/1/1	G-20 (VA)	-
Fuego ⁴⁾	Metazachlor	15	K3	1,5 l	45,40	VA, NA 10-14	*)	+++	+++	++	++	+	****)	+	++	+	5/5/1/1	G-15	-
Butisan Gold AT ^{4,8)}	Metazachlor +Dimethenamid-P + Qinnerac	15,4,15	K3,O,K3	2,5 l	126,30	VA, NA 10-12	+++	+++	+++	+++	+++	+++	****)	+	+++	+	VA: -/20/10/10 NA: -/20/10/5	VA: G- -/20/10/10 NA: n.z.	-
Fuego top ⁴⁾	Metazachlor +Quinnerac	15,4	K3,O	2,0 l	90,30	VA, NA 10-14	+++	+++	++(+)	+++	+++	+	****)	+	++(+)	+	5/5/1/1	G-15	-
Gajus ⁸⁾	Pethoxamid + Picloram	15,4	K3, O	3,0 l	90,30	VA, NA 10-14	+++	+++	++	+++	+++	++	++	++	+++	(+)	10/10/1/1	G-10	-
Gajus ⁸⁾ +Tanaris ⁹⁾	Pethoxamid + Picloram	15,4	K3, O	2,0 + 1,0	123,00	VA, NA 10-14	+++	+++	++(+)	+++	+++	++(+)	++(+)	++	+++	(+)	10/10/1/1	G-15 (VA); n.z. (NA)	-
Tanaris ⁷⁾	Dimethenamid-P + Quinnerac	15,4	K3, O	1,5 l	85,80	VA, NA 10-18	+++	+++	++	+++	+++	+	++	+	++	-	5/1/1/1 (VA); 10/1/1/1 (NA)	G-15 (VA); n.z. (NA)	-
Belkar ^{8,9)}	Haluxifen-methyl + Picloram	4	O	0,5 l; 2 x 0,25 l	103,60	NA 16-18 (0,5 l); NA 12-18 (2 x 0,25 l)	+++	++(+)	+	+++	+(+)	+++	+	++	+++	-	1	-	-
Tanaris ⁷⁾ plus Belkar ^{8,9,10)}	Dimethenamid-P+ Quinnerac + Haluxifen-methyl + Picloram	15,4	K3, O	1,0 + 0,25 l	114,50	NA 12-18	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	++	+++	-	10/1/1/1	n.z.	
Kerb FLO	Propyzamid	3	K1	1,25 l	41,90	NA ab 14, Spätherbst, Winter	-	-	+++	-	++	-	-	-	+	+++	1	-	-

Wirkung von Herbiziden auf Leitunkräuter in Winterraps (BRSNW) (Auswahl)

Mittel	Wirkstoff(e)		HRAC- Einstufung ⁶⁾	Aufwand- menge je ha	Preis/ha ¹⁾ EUR	Anwendungszeit (BBCH Stadien)	Klettenlabkraut	Kamille	Vogelmiere	Taubnessel	Ehrenpreis	Besenrauke	Hirtentäschel, Hellerkraut	Ackerstief- mütterchen	Klatschmohn	Ausfallgetreide	Abstände zu Oberflächen- gewässern in m ²⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragsgefahr in m ³⁾	
NA ab 3-Blatt der Gräser																			
Gräserherbizide																			
Agil-S/Ready	Propaquizafop	1	A	0,7-1,0 l	21,00 - 30,00/ 19,30-25,70		-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	1	-	-
Centurion Plus	Clethodim	1	A	1 l	33,60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	1	-	-
Focus ultra ⁷⁾	Cycloxydim	1	A	1,5 - 2 l	46,00 - 61,30		-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	1	-	-
Fusilade MAX	Fluazifop-P	1	A	1,0 l	28,60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	1	n.z.	
Panarex	Quizalofop-p-tefuryl	1	A	1,25 l	27,00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	1	-	-
Targa super	Quizalofop-p-ethyl	1	A	0,5 + 2 l Öl	45,50		-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	1	-	-
Frühjahr																			
Korvetto	Clopyralid + Halauxifen-methyl	4	O	1,0 l	54,12	NA 10-50	+++	+++	+	+++	+	++(+)	+	++	++(+)	-	1	-	-
Cliophar 600 SL	Clopyralid	4	O	0,2 l + 2 l Öl	81,70	ab Vegetations-beginn bis Knospen-stadium (30-50)	-	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Lontrel 720 SG	Clopyralid	4	O	167 g + 2 l Öl	76,90	NA 10-50	-	+++	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1) ca. Preise 2025/26, exkl. Mwst Mwst.; größtes Gebinde 2) Regelabstand/50/75/90 % Abtrifftminderungsklasse 3) Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in Meter (je nach Düse kann er unterschiedlich sein) und wenn angegeben ein bewachsener Grünstreifen (mit G und Meterangabe-gekennzeichnet) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtrifftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden - außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Unkrautbekämpfung im Nachauflauf, Bodenbedeckung mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchte, rauhes Saatbett, Grünstreifen und Querdämme kann das Risiko reduziert werden. 4) Keine Anwendung in Wasserschutz- und Schongebieten und bei Teilnahme am ÖPUL-Programm "Grundwasser 2020" in OÖ 5) Keine Anwendung in Wasserschutz- und Schongebieten 6) Klassifizierung des Wirkungsmechanismus; Resistenzvermeidung durch Verwendung von Produkten aus verschiedenen Gruppen 7) Anwendung auf derselben Fläche nur alle 2 Jahre 8) nur eine Anwendung innerhalb von drei Jahren auf derselben Fläche erlaubt 9) nur eine bzw. bei Splitting zwei Anwendungen erlaubt; nur einmal in drei Jahren auf derselben Fläche einsetzbar 10) SPe 8 - Bienengefährlich! Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen. Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind. Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden. 11) Bei der Ausbringung des Mittels muss zum Schutz von unbeteiligten Dritten verlustmindernde Technologie (Abdriftminderungsklasse 50% oder höher gemäß Amtlichen Nachrichten des Bundesamtes für Ernährungssicherheit Nr. 15/2024 – in der jeweils geltenden Fassung) eingesetzt werden. VSE = Vorsaatbearbeitung VA = Voraufaufbehandlung NA = Nachaufaufbehandlung Herbizidwirkung: +++ sehr gut wirksam ++ gut wirksam + schwach/nur im Wachstum gehemmt *) Im Keimblattstadium des Klettenlabkrautes **) bei starkem Klettenlabkrautdruck ***) nur im VA bis 5 max. 7 Tage nach der Saat																			

Wirkung von Herbiziden auf Leitunkräuter in Winterraps (BRSNW)-Frühjahr (Auswahl)

Mittel	Wirkstoff(e)	HRAC-Einstufung ⁴⁾		Aufwand- menge je ha	Preis/ha ¹⁾ EUR	Anwendungs- zeit (BBCH Stadien)	Klettenlabkraut	Kamille	Vogelmiere	Taubnessel	Ehrenpreis	Besenrauke	Hirtentäschel, Hellerkraut	Klatschmohn	Ausfallgetreide	Abstände zu Oberflächen- gewässern in m ²⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragungsgefahr in m ³⁾	
		neu	alt															
Clio Phar 600 SL	Clopyralid	4	O	0,2 l + 2 l Öl	81,70	NA 10-50	-	+++	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Korvetto	Haluxifen-methyl + Clopyralid	4	O	1,0 l	54,12	ab Vegetations- beginn bis Knospen- stadium (30-50)	+++	+++	+	+++	+	++(+)	+	++(+)	-	1	-	-
Lontrel 720 SG	Clopyralid	4	O	167 g + 2 l Öl	76,90	NA 10-50	-	+++	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Gräserherbizide																		
Agil-S/Ready	Propaquizafop	1	A	0,7-1,0 l	21,00 - 30,00/ 19,30-25,70	NA ab 3-Blatt der Gräser	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	1	-	-
Centurion Plus	Clethodim	1	A	1 l	33,60		-	-	-	-	-	-	-	-	+++	1	-	-
Focus ultra ⁵⁾	Cycloxydim	1	A	1,5 - 2 l	46,00 - 61,30		-	-	-	-	-	-	-	-	+++	1	-	-
Fusilade MAX	Fluazifop-P	1	A	1,0 l	28,60		-	-	-	-	-	-	-	-	+++	1	n.Z.	
Panarex	Quizalofop-p-tefuryl	1	A	1,25 l	27,00		-	-	-	-	-	-	-	-	+++	1	-	-
Targa super	Quizalofop-p-ethyl	1	A	0,5 + 2 l Öl	45,50		-	-	-	-	-	-	-	-	+++	1	-	-

1) Preisbasis: unverb. empf. Listenpreise 2026 exkl. MwSt, größte Verpackungseinheit

2) Regelabstand/50/75/90 % Abtriftminderungsklasse

3) Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in Meter (je nach Düse kann er unterschiedlich sein) und wenn angegeben ein bewachsener Grünstreifen (mit G und Meterangabe-gekennzeichnet) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden - außer wenn extra angegeben; n.Z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Unkrautbekämpfung im Nachauflauf, Bodenbedeckung mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchte, rauhes Saatbett, Grünstreifen und Querdämme kann das Risiko reduziert werden.

4) Klassifizierung des Wirkungsmechanismus; Resistenzvermeidung durch Verwendung von Produkten aus verschiedenen Gruppen

5) Anwendung auf derselben Fläche nur alle 2 Jahre

NA = Nachauflaufbehandlung

Herbizidwirkung:

+++ sehr gut wirksam

++ gut wirksam

+ schwach/nur im Wachstum gehemmt

Rapsinsektizide (Winterraps-BRSNW, Sommerraps-BRSNS) (Auswahl)

Mittel	IRAC Einstufung ⁵⁾	Wirkstoff	Aufwandmenge je ha	Preis/ha ¹⁾ EUR	Kohltriebrüssler/ Stängelrüssler	Rapsglanzkäfer	Kohlshotenrüssler	Kohlshotenmücke	Rapserrfloh	Rübsenblattwespe	Wartezeit in Tagen	maximale Anzahl der Anwendung	Abstände zu Oberflächenge- wässern in m ²⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragungsgefahr ³⁾		Bienengefährlichkeit ⁴⁾
Synthetische Pyrethroide																
Cymbigon Forte	3A	Cypermethrin	0,050 l	2,90	X	X	X	-	X	X	49	2	-/-/20/10	G -/-/20/15	-	SPe 8*
Decis Forte	3A	Deltamethrin	0,0625-0,075 l	5,70 - 6,80	0,0625 l	0,075 l	0,075 l	0,075 l	0,0625 l	-	45	2	-/-/15/5 - 0,0625 l -/-/20/10 - 0,075 l	-	-	SPe 8*
Delta Super Karate Zeon	3A	Deltamethrin	0,3 l	4,50	X	X	X	-	X	0,2 l	56	2	-/-/30/15 (0,3 l) -/-/20/10 (0,2 l)	-	-	SPe 8
	3A	Lambda-Cyhalotrin	0,075 l	9,50	X	X	X	X	X	X	35	2	-/10/5/5	-	-	SPe 8
																-; in Mischungen mit Azolen SPe 8
Mavrik Vita/Evure	3A	Tau-Fluvalinat	0,2 l	15,00/11,50	-	X	X	X	X	X	56	1	-/30/15/10	-	-	
Nexide ⁷⁾	3A	Gamma-Cyhalotrin	0,08 l	?	X	X	X	X	X	X	28	2	-/-/-/15	G- -/-/-/20	-	SPe 8
Sherpa Duo	3A	Cypermethrin	0,25 l	19,00	-	X	X	-	X ⁶⁾	-	28	2	-/-/20/20	G- -/-/20/20	-	SPe 8*
Sumi-Alpha/ Somicidin Top	3A	Esfenvalerate	0,3 l	8,60/8,50	X	X	X	-	X	X	56	-	10	-	-	SPe 8*
Trebon 30 EC	3A	Etofenprox	0,2 l	14,70	X	X	X	-	-	-	-*	2	-/30/15/10	G-10	-/30/15/10	SPe 8*
Butenolide																
Sivanto Energy	4D 3A	Flupyradifuron + Deltamethrin	0,5-0,75 l	18,30 - 27,50	0,75 l	0,75 l	0,5 l	0,5 l	-	-	45	2	-/-/20/5 (0,75 l) - /20/10/5 (0,5 l)	G -/-/20/20 (0,75 l) G -/20/10/10 (0,5 l)	-	SPe 8*
Neonicotinoide																
Carnadine	4A	Acetamiprid	0,2 l	15,40	-	X	-	-	X	-	28	1	-/1/1/1	-	10	SPe 8*
Mospilan 20 SG	4A	Acetamiprid	0,2 kg	18,20	-	X	-	-	-	-	-*	1	3/1/1/1	-	-	-
Diamide																
Benevia ⁸⁾	28	Cyantraniliprole	0,193 l	?	-	-	-	-	X	-	-	1	1	G-20	-	SPe 8*

1) unverb. empf. Listenpreise 2026 exkl. Mwst größte Verpackungseinheit

2) Regelabstand/50/75/90 % Abtriftrminderungsklasse

3) Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in Meter (je nach Düse kann er unterschiedlich sein) und wenn angegeben ein bewachsener Grünstreifen (mit G und Meterangabe-gekennzeichnet) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden - außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Bodenbedeckung mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchte, rauhes Saatbett, Grünstreifen und Querdämme kann das Risiko reduziert werden.

4) **SPe 8***: Bienengefährlich! - Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen. Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind.

Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden.

SPe 8: Bienengefährlich! - Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen. Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind.

Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden. Im Fall von Anwendungen in blühenden Kulturen darf die Anwendung nur nach dem Ende des täglichen Bienenflugs bis 23 Uhr erfolgen - keine Einstufung (nicht bienengefährlich)

5) IRAC-Einstufung (Wirkungsmechanismus): Zur Vermeidung von Resistenzen unterschiedliche Wirkungsmechanismen verwenden

-* Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich

6) Zulassung nur in Sommerraps

7) bis 30.9.2026 zu verbrauchen

8) Notfallzulassung von 20.8.bis 17.12.2026. Die Anwendung darf nur alle 3 Jahre auf derselben Fläche erfolgen. Keine zusätzliche Anwendungen mit anderen Mitteln, die den Wirkstoff Cyantraniliprole enthalten.

Rapsfungizide (Winterraps-BRSNW, Sommerraps-BRSNS) (Auswahl)

Mittel	Wirkstoff	Einstufung nach FRAC ⁴⁾	Aufwand- menge je ha	Preis/ha ¹⁾ EUR	Phoma-Wurzelhals- u. Stängelfäule	Sclerotinia- Weissstängeligkeit	Alternaria- Rapsschwärze	Standfestigkeit	Winterfestigkeit	Wartezeit in Tagen	Abstände zu Oberflächenge- wässern in m ²⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragungsgefahr ³⁾	
Amistar Gold	Azoxystrobin + Difenconazol	11,3	1 l	30,60	X	X	-	-	-	-*	5/1/1/1	-	5
Cantus/Bonafide	Boscalid	7	0,5 kg	64,90/48,90	X	X	X	-	-	56	1	-	-
Cantus Revy	Boscalid + Mefentrifluconazol	7,3	0,8-1,0 l	52,80 - 66,00	-	X	X	-	-	-*	1	-	-
Carax/Credible	Metconazol+Mepiquatchlorid	3	0,7-1,4 l	29,10 - 58,20	X	-	-	X	X	-*	10/5/5/1	G-10	-
Lalstop Contans WG⁴⁾	Coniothyrium minitans	-	2,0 kg	77,50	-	X	-	-	-	-	1	-	-
Folicur	Tebuconazol	3	1,0-1,5 l	16,10 - 24,10	X	X	X	X	X	56	10/5/5/1;15/10/5/5	G-10	-
Magnello	Tebuconazol + Difonocanazol	3,3	0,8 l	32,70	X	-	-	-	-	-*	5/1/1/1	-	-
Mystic 250 EW	Tebuconazol	3	1,5 l	22,50	X	X	X	X	1 l	-*	15/10/5/5	G-10	15/10/10/10
Nuxine	Cerevisan	P06	2,0 l	?	-	X	-	-	-	-*	1	G-1	-
Ortiva/Zaftra AZT 250 SC/Azoshy	Azoxystrobin	11	1,0 l	26,40/28,40/1 9,70	-	X	X	-	-	-*	5/5/1/1	G-10	-
Pecari 300 EC⁵⁾	Prothioconazol	3	0,6 l	15,60	X	X	-	-	-	56	10	-	-
Propulse	Prothioconazol + Fluopyram	3 7	1,0 l	63,50	-	X	X	-	-	56	5/1/1/1	-	-
Promesa	Azoxystrobin	11	1,0 l	26,00	-	X	X	-	-	-	5/1/1/1	-	-
Prosaro	Prothioconazol + Tebuconazol	3 3	1 l	33,20	-	X	-	-	-	-*	5/5/1/1	-	5
Revyona	Mefentrifluconazole	3	1,5 l; 2 x 0,75 l	33,20	X	-	-	-	-	+	1	-	-
		3	2 l	44,20	-	X	X	-	-	+	1	-	-
Sirena/Metfin	Metconazol	3	1,2 l	34,20/30,70	X	-	X	X	-	-*	5/5/1/1	-	-
Tebu Super 250 EW	Tebuconazol	3	1,0 l	12,70	X	-	-	-	X	60	5/5/1/1	G-20	20
Tebucur 250 EW	Tebuconazol	3	1,0 l	12,70	X	X	X	-	-	56	5/5/1/1	G-10	-
Tebusha 25 EW	Tebuconazol	3	1,5 l	19,00	X	X	X	X	X	-*	15/10/5/5	G-10	15/10/10/10
Tazer 250 SC	Azoxystrobin	11	1,0 l	21,00	-	X	X	-	-	21	1	G-1	-
Tilmor	Prothioconazol + Tebuconazol	3 3	1,0 l	32,10	X	-	-	X	X	-*	10/5/5/1	G-10	-
Toprex	Paclobutrazol + Difenconazol	3,3	0,35-0,5 l	29,20 - 41,80	X	-	-	X	-	-*	5/5/1/1	-	-

1) unverb. empf. Listenpreise 2026 exkl. MwSt; größte Verpackungseinheit

2) Regelabstand/50/75/90 % Abtriftminderungsklasse

3) Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in Meter (je nach Düse kann er unterschiedlich sein) und wenn angegeben ein bewachsener Grünstreifen (mit G und Meterangabe-gekennzeichnet) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden - außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Unkrautbekämpfung im Nachauflauf, Bodenbedeckung mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchte, rauhes Saatbett, Grünstreifen und Querdämme kann das Risiko reduziert werden.

4) FRAC-Einstufung (Fungizid-Wirkungsgruppen): Zur Vermeidung von Resistenzen unterschiedliche Wirkungsgruppen in Mischungen oder Spritzfolgen kombinieren

5) Bei der Anwendung des Mittels muss zu angrenzenden Flächen, die von unbeteiligten Dritten genutzt werden, ein Abstand von mindestens 5 m eingehalten werden.

6) Nur bedingt wirksam (Stimulierung natürlicher Abwehrkräfte)

-* Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich

Herbizide in ACKERBOHNE (VICFM) - Aufwandmengen und Wirkungsspektren (Auswahl)

Produkt	Wirkstoff	HRAC Einstufung ³⁾		Aufwand- menge	Preis/ha ¹⁾ EUR	Klettenlabkraut	Gänsefuß-gewächse	Amaranth	Kamille	Knötericharten	Holzzahn	Ehrenpreis	Vogelmiere	Ausfallraps	Distel	Flughäfer	Hirsearten	Abstände zu Oberflächen- gewässern in m ²⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragsgefahr ⁴⁾	
Voraufarbeitungsprodukte		neu	alt																	
Bandur/Chanon	Aclonifen	32	S (F3)	2 l	46,90 / 42,40 46,70/45,50/	++	+++	++	++	++(+)	++	+++	+++	+++	-	+	+	15/5/5/1 bzw. 15/10/10/10 bzw. -/15/10/5	G-15/10/10/10 bzw. G - /20/20/20 (Chanon)	-
Boxer/Fantasia/Roxy EC	Prosulfocarb	15	N (K3)	5 l	33,60	+++	++(+)	+++	+	++(+)	+++	+++	+++	+++	-	-	++(+)	10/5/5/1	n.z.	
Centium CS	Clomazone	34	F3	0,25 l	54,60	+++	++	+++	-	++	+++	+	+++	-	-	-	+	1	-	-
Clomate	Clomazone	34	F3	0,25 l	16,80	+++	++	+++	-	++	+++	+	+++	-	-	-	+	1	-	-
Conaxis	Dimethenamid-p +	15	K3	1,5 l	57,70	+++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	-	-	-	+++	1	n.z.	
Novitron Dam Tec	Clomazone	34	F3																	
	Clomazone +	34	F3	2,4 kg	110,30	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++	+++	-	+	++(+)	-/20/10/5	G 20	-/20/20/20
Proman⁷⁾	Aclonifen	32	F3																	
	Metobromuron	5	C2	2 l	69,40	+	++(+)	++(+)	++(+)	++	+++	++(+)	+++	++	-	-	++(+)	5	n.z.	
Spectrum plus	Dimethenamid-P +	15	K3	4 l	91,30	++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++	++	-	+	+++	30/15/15/5	30 (G-20)/	
Stallion Sync TEC	Pendimethalin	3	K1																15 (G-10)/15 (G-10)/G-10	
	Clomazone +	34	F3	3 l	93,80	+++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	(+)	-	(+)	++	20/10/5/1	G-20/10/5/5	
Stomp Aqua	Pendimethalin	3	K1	3,5 l	77,00	++(+)	+++	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++	++	-	-	++	20/20/10/5	G 5	20/20/10/5
Bandur + Stomp Aqua	Aclonifen +	32	S (F3)	2 + 3 l	112,90	+++	+++	+++	+++	++	++(+)	+++	+++	+++	-	+	+++	20/20/10/5	G-15/10/10/10	20/20/10/10
	Pendimethalin	3	K1																	
Boxer + Stomp Aqua	Prosulfocarb +	15	N (K3)	3,5 + 1,5-2 l	65,70 - 76,70	+++	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++	+++	+++	-	-	+++	20/20/10/5	n.z.	
	Pendimethalin	3	K1																	
Nachaufarbeitungsprodukte																				
Pulsar Plus^{5,6)}	Imazamox	2	B	1,2-1,6	42,30 - 56,40	++	++(+)	+++	++	++(+)	+++	++	+++	+++	++	+	++(+)	1	-	-
Gräserprodukte																				
Agil-S/Ready	Propaquizafop	1	A	0,75-1,0 l	22,50-30,00/ 19,30-25,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	+++	1	-	-
Focus ultra	Cycloxydim	1	A	1,5 - 2 l	46,00 - 61,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	+++	1	-	-
Fusilade MAX	Fluazifop-P	1	A	1 l	28,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	+++	1	n.z.	
Panarex	Quizalofop-p-tefuryl	1	A	1,25 l	27,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	+++	1	-	-
Targa super	Quizalofop-P	1	A	0,5 + 2 l Öl	45,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	+++	1	-	-

1) unverb. empf. Listenpreise 2026 exkl. Mwst größte Verpackungseinheit

2) Regelabstand/50/75/90 % Abdriftminderungsklasse

3) Klassifizierung des Wirkungsmechanismus; Resistenzvermeidung durch Verwendung von Produkten aus verschiedenen Gruppen

4) Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in

Meter (je nach Düse kann er unterschiedlich sein) und wenn angegeben ein bewachsener Grünstreifen (mit G und Meterangabe gekennzeichnet) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde

Maßnahmen nicht weiter reduziert werden - außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Unkrautbekämpfung im

Nachauflauf, Bodenbedeckung mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchte, rauhes Saatbett, Grünstreifen und Querdämme kann das Risiko reduziert werden.

5) Notfallzulassung gem. Art. 53 VO (EG) Nr. 1107/2009 vom 1.4.-20.7.2026 genehmigt

6) nur eine Anwendung innerhalb von drei Jahren auf derselben Fläche erlaubt

7) nur in der Saatguterzeugung erlaubt

rot: Zusatzwirkung

+++ sehr gute Wirkung

++ gute Wirkung

+ schwache Wirkung

- keine Wirkung

Zugelassene Insektizide im Eiweißpflanzenbau (Auswahl)

Präparat	Wirkstoff	Ein- stufung nach IRAC ⁴⁾	Aufwand- menge/ha	ca. Preis €/ha ¹⁾	Indikation ⁷⁾	Wartefrist in Tagen	Wirkung auf Bienen ⁵⁾	Abstände zu Oberflächen- gewässer in m ²⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragungsgefahr ³⁾	
Cymbigon Forte⁶⁾	Cypermethrin	3A	0,05 l	2,90	Blattläuse in Ackerbohne; Blattrandkäfer und Erbsenwickler in Erbse und Lupine	14	SPe8*	Ackerbohne -/15/10 Erbse, Lupine -/20/10	Ackerbohne: G -/1/20/20 Erbse, Lupine G -/1/20/15	-
Karate Zeon	Lambda-Cyhalothrin	3A	0,075 l	9,50	saugende Insekten, beißende Insekten in: Ackerbohne, Futtererbsen, Klee-Arten ⁶⁾ , Luzerne ⁶⁾ , Soja ⁶⁾ , Lupine-Arten	Ackerbohne: 7 Futtererbsen: 7 Lupinearten: 7 Sojabohne: 35 Klee, Luzerne: nur für Saatgutver- mehrung	SPe 8	-/10/5/5	-	-
Neudosan Neu⁶⁾	Fettsäuren, Kaliumsalze (Kali- Seife)	-	18 l	182,30	saugende Insekten in Ackerbohne ⁶⁾ , Lupine-Arten ⁶⁾ u. Futtererbse ⁶⁾	-	-	5/1/1/1	-	-
Pirimor Granulat⁸⁾	Pirimicarb	1A	0,3 kg	25,90	Ackerbohne Blattläuse	35	Spe 8	-/1/20	-	-
Sivanto Prime	Flupyradifuron	4D	0,375 l	37,00	Grüne Erbsenblattlaus in Ackerbohne, Futtererbse, Kichererbse, Weiße Lupine, Linse	7 (Ackerbohne, Kichererbse, Weiße Lupine, Linse) 3 (Futtererbse)	-*	1/1/1/1	20/20/20/20	-
Spruzit Schädlingfrei⁶⁾	Pyrethrine, Rapsöl	3A	6 l	100,10	Erbsenwickler, zur Befallsminderung	Futtererbse	-	20/10/5/1	-	-
Sumi-Alpha/ Sumicidin Top	Esfenvalerate	3A	0,2 l	5,70/5,60	saugende Insekten in Futtererbse	42	SPe8*	10/10/10/10	-	-

1) unverb. empf. Listenpreise 2026 exkl. Mwst., größtes Gebinde

2) Regelabstand/50/75/90 % Abtriftminderungsklasse

3) Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in Meter (je nach Düse kann er unterschiedlich sein) und wenn angegeben ein bewachsener Grünstreifen (mit G und Meterangabe gekennzeichnet) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden - außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B.

Bodenbedeckung mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchte, rauhes Saatbett, Grünstreifen und Querdämme kann das Risiko reduziert werden.

4) IRAC-Einstufung (Wirkungsmechanismus): Zur Vermeidung von Resistenzen unterschiedliche Wirkungsmechanismen verwenden

5) **SPe 8***: Bienengefährlich! - Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen. Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind. Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden.

SPe 8: Bienengefährlich!-Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen. Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind.

Eine Anwendung darf nur nach Ende des täglichen Bienenfluges bis 23:00 Uhr erfolgen. Keine Anwendung, wenn Randvegetation oder angrenzende Felder in Blüte stehen.

--* Das Mittel darf an blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen befliegen werden, nicht in Mischung mit Fungiziden aus der Gruppe der Ergosterol-Biosynthese-Hemmer angewendet werden.

Mischungen des Mittels mit Ergosterol-Biosynthese-Hemmern müssen so angewendet werden, dass blühende Pflanzen nicht mitgetroffen werden.

6) Schäden, einschl. Ertragsminderung, a. d. Kultur möglich; mögliche Schäden a. d. Kultur liegen im Verantwortungsbereich d. Anwenders.

7) EPPO-Codes: Ackerbohne (VICFM), Erbse (PIBSX, PIBSA), Lupine-Arten (3LUPC), Klee-Arten (3CLOC), Luzerne (MEDSA), Soja (GLXMA), Kichererbse (CIEAR), Weiße Lupine (LUPAL), Linse (LENCU)

Ackerbohnenfungizide (VICFM)(Auswahl)

Mittel	Wirkstoff€	Einstufung nach FRAC ³⁾	Aufwandmenge je ha	ca Preis €/ha ¹⁾	Ascochyta-Brennfleckenkrankheit	Botrytis-Schokoladenfleckenkrankheit	Ackerbohnenrost	Falscher Mehltau	Echte MehltauPilze	Wartezeit in Tagen	Abstände zu Oberflächen-gewässern in m ²⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragsgefahr ⁵⁾	
Elatus Era⁴⁾	Prothioconazol + Benzovindiflupyr	3, 7	0,66 l	43,80	X	X	X	-	-	-*	10	G-10	-
Folicur	Tebuconazol	3	1,0 l	16,10	-	X	X	-	X	-*	10/5/5/1	G-10	-
FytoSave	COS-OGA	-	2,0 l	47,50	-	-	-	-	X	-	1	-	-
Luna Sensation	Fluopyram + Trifloxystrobin	7, 11	0,8 l	162,80	Zulassung gegen Grauschimmel und Weißstängeligkeit					14	10/5/1/1	-	-
Mystic 250 EW⁴⁾	Tebuconazol	3	1,0 l	15,00	-	X	X	-	-	-*	10/5/5/1	G-10	-
Ortiva⁴⁾/ Azoshy /Zaftra AZT 2	Azoxystrobin	11	1,0 l	26,40/19,70/28,40	-	X	X	X	-	35	5/5/1/1	G-10	-
Promesa	Azoxystrobin	11	1,0 l	25,90	-	X	X	X	-	35	5/5/1/1	G-10	-
Revyona	Mefentrifluconazol	3	1,3 l	28,70	X	X	X	-	-	-*	1	-	-
Tebusha 25 EW	Tebuconazol	3	1,0 l	19,00	-	X	X	-	-	-*	10/5/5/1	G-10	-

1) unverb. empf. Listenpreise 2026 exkl. MwSt
größte Verpackungseinheit

2) Regelabstand/50/75/90 % Abtriftminderungsklasse

3) FRAC-Einstufung (Fungizid-Wirkungsgruppen): Zur Vermeidung von Resistenzen unterschiedliche Wirkungsgruppen in Mischungen oder Spritzfolgen kombinieren

-* Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich

4) Mögliche Schäden an der Kultur liegen im Verantwortungsbereich des Anwenders. Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit und Wirksamkeit unter den betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

5) Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in Meter (je nach Düse kann er unterschiedlich sein) und wenn angegeben ein bewachsener Grünstreifen (mit G und Meterangabe gekennzeichnet) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden - außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Bodenbedeckung mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchte, rauhes Saatbett, Grünstreifen und Querdämme kann das Risiko reduziert werden.

Herbizide in ERBSE (PIBSA) - Aufwandmengen und Wirkungsspektren (Auswahl)

Produkt	HRAC Einstufung ³⁾		Aufwand- menge	Klettenlabkraut	Gänsefußgewächse	Amaranth	Kamille	Knötericharten	Holzzahn	Ehrenpreis	Vogelmiere	Ausfallraps	Distel	Flughäfer	Hirsearten	ca. Preis/ha ¹⁾ Euro	Abstände zu Oberflächen- gewässern in m ²⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragsgefahr ³⁾	
Voraufarbeitungsprodukte	neu	alt																	
Bandur/Chanon/Fantasia	32	S(F3)	2 l	++	+++	++	++	++(+)	++	+++	+++	+++	-	+	+	46,90/21,20/18,00	15/5/5/1	G-15/10/10/10	-
Bandur + Stomp Aqua	32,3	S,K1	2 + 3 l	+++	+++	+++	+++	++	++(+)	+++	+++	+++	-	+	++	110,90	15/10/5/5	G-5	20/15/10/5
Boxer/Cofeno/Fantasia/Roxy EC	15	N (K3)	5 l	+++	+(+)	+++	+	+(+)	+++	+++	+++	+++	-	-	-	46,70/?/45,50/ 33,60	10/5/5/1	n.z.	
Boxer + Stomp Aqua	15,3	N (K3),K1	2,5 + 2,5 l	+++	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++	+++	+++	-	-	++	78,40	20/10/5/5	n.z.	
Centium CS	34	F3	0,25 l	+++	++	++	+	++	+	++	+++	-	-	-	-	27,30	1	-	-
Centium CS + Stomp Aqua	34,3	F3,K1	0,25 + 2 l	+++	+++	+++	++	++	++(+)	+++	+++	+	-	-	+(+)	71,30	15/10/5/5	G-5	20/15/10/5
Clomate	34	F3	0,25 l	+++	++	++	+	++	+	++	+++	-	-	-	-	16,80	1	-	-
Conaxis	15,3	K3,F4	1,5 l	+++	++	+++	+++	++	+++	+++	+++	-	-	-	+++	57,70	1	G-20	
Novitron Dam Tec	34,3	F3,F4	2,4 kg	+++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++	+++	-	+	+++	110,30	-/20/10/5	G -/20/20/20	-
Spectrum plus	15,3	K3, K1	4 l	++	+++	+++	++	++	+++	+++	+++	++	-	+	+++	91,30	30/15/15/5	G-20/10/10/10	30/15/15/10
Stallion Sync TEC	34,3	F3,K1	3 l	+++	+++	+++	++	+++	+++	+++	+++	(+)	-	(+)	++	93,80	20/10/5/1	G-20/10/5/5	-
Stomp Aqua	3	K1	3,5 l	++(+)	+++	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++	++	-	-	++	77,00	20/20/10/5	G-5	20/20/10/5
Nachaufarbeitungsprodukte																			
Butoxone-Splitting	4	O	2 x 1,5 l	+	+++	+++	-	+	+	+	+	+++	+++	-	-	55,23	1	-	-
Lentagran 45 WP	6	C3	1,0; 2 x 0,5 kg	++(+)	+++	+++	+	+	+++	+	+	(+)	-	-	-	82,70	1	-	-
Pulsar Plus ^{5,6)}	2	B	1,6 l	++	++(+)	+++	++	++(+)	+++	++	+++	+++	++	+	+(+)	56,40	1	-	-
Gräserprodukte																			
Agil-S/Ready	1	A	0,75-1,0 l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	+++	22,50-30,00/ 19,30-25,70	1	-	-
Focus ultra	1	A	1,5 - 2 l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	+++	46,00 - 61,30	1	-	-
Fusilade MAX	1	A	1 l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	+++	28,60	1	n.z.	
Panarex	1	A	1,25 l	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	+++	27,00	1	-	-
Targa super	1	A	0,5 + 2 l Öl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+++	+++	45,50	1	-	-

Legende:

+++ sehr gute Wirkung
 ++ gute Wirkung
 + schwache Wirkung
 - keine Wirkung

1) ca. Preise 2026 exkl. MwSt., größtes Gebinde

2) Regelabstand/50/75/90 % Abtriftminderungskategorie (m)

3) Klassifizierung des Wirkungsmechanismus; Resistenzvermeidung durch Verwendung von Produkten aus verschiedenen Gruppen

4) Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in Meter (je nach Düse kann er unterschiedlich sein) und wenn angegeben ein bewachsener Grünstreifen (mit G und Meterangabe gekennzeichnet) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden - außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Unkrautbekämpfung im Nachaufauf, Bodenbedeckung mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchte, rauhes Saatbett, Grünstreifen und Querdämme kann das Risiko reduziert werden.

5) Notfallzulassung gem. Art. 53 VO (EG) Nr. 1107/2009 vom 1.4. - 20.7.2026 genehmigt

6) nur eine Anwendung innerhalb von drei Jahren auf derselben Fläche erlaubt

Zugelassene Herbizide in Erdäpfel (SOLTU) (Quelle: LK-NÖ, Julia Muck-Arthaber, BSc)

Mittel	Wirkstoff	Wirkungsmechanismus laut HRAC-Code	Wirkungsmechanismus laut HRAC-Code NEU	Aufwandmenge/ha	Preis in EUR /ha	Ackerdistel	Anarant	Bingelkraut	Franzosenkraut	Gänsefuß und Melde	Holzhahn	Kamille	Klettenlabkraut	Krötencharfen	Schwerzer Nachtschatten	Ausfalltraps	Ausfallkommenblume	Flugfalter	Hirscharten	Quecke	Abstandsaufgaben zu Oberflächengewässern in m	Abstände zu Gewässern bei Abtragsgefährdung in m
--------	-----------	------------------------------------	--	-----------------	------------------	-------------	---------	-------------	----------------	--------------------	----------	---------	-----------------	---------------	-------------------------	--------------	--------------------	------------	-------------	--------	---	--

TAB. 1 HERBIZIDE FÜR DEN VORAUF

Bandur	Aclonifen	F3	32	2 l	46,90	0	+++	+++	+++	+++	++	++	++(+)	++(+)	+	+++	0	+(+)	++(+)	(+)	15/10/5/1	G-15/10/10/10
Boxer	Prosulfocarb	N	15	5 l	46,70	0	+++	+	+++	++(+)	++(+)	+	+++	++(+)	+++	+++	0	+	++	0	10/5/5/1	n.z.
Centium CS	Clomazone	F4	13	0,25 l	54,60	0	++	+	+++	++	+++	0	+++	++	+	0	0	0	0	1	-	
Chandor	Aclonifen	F3	32	2 l	42,40	0	+++	+++	+++	+++	++	++	++(+)	++(+)	+	+++	0	+(+)	++(+)	(+)	15/10/5/1	G - 15/10/10/10
Novitron Dam Tec	Clomazone + Aclonifen	F4 + F3	13 + 32	2,4 kg	110,30	0	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	++	+	+++	0	++	+++	0	*/20/10/5	G- */20/20/20
Proman	Metobromuron	C2	5	4 l	138,80	0	+	+	+++	+++	+++	+++	+	++	+	++	0	+	+	0	5/1/1/1	n.z.
Roxy 800 EC	Prosulfocarb	N	15	4 l	32,40	0	+++	+	+++	++(+)	++(+)	+	+++	++(+)	+++	+++	0	+	++	0	10/5/5/1	n.z.
Sinopia	Metobromuron + Clomazone	F4, C2	13 + 5	3 l	119,20	+	++	++	+++	+++	+++	+++	++	+++	+++	+++	0	+	+	0	1	G-20
Stallion Sync TEC	Clomazone + Pendi-methalin	F4 + K1	13 + 3	3 l	93,80	0	+++	++	+++	+++	+++	++	+++	++	++	+	0	0	++	0	*/15/5	n.z.

TAB. 2 HERBIZIDE FÜR DEN NACHAUFLAUF

Titus + Netz-mittel	Rimsulfuron	B	2	40 g + 250 ml oder Split-ting 2 x 20 g + 250 ml	46,80	+	+++	+++	++	+	+++	+++	++(+)	+	0	+++	+++	++(+)	+++	++(+)	1	-
---------------------	-------------	---	---	---	-------	---	-----	-----	----	---	-----	-----	-------	---	---	-----	-----	-------	-----	-------	---	---

TAB. 3 KOMBINATIONEN GEGEN BREITE MISCHVER-UNKRAUTUNG

Bandur + Boxer	Aclonifen + Prosulfocarb	F3 + N	32 + 15	2 l + 3 l	74,90	0	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	++(+)	+++	+++	0	++(+)	++(+)	(+)	15/10/5/1	n.z.
Proman + Boxer	Metobromuron + Prosulfocarb	C2 + N	5 + 15	2,5 l + 2,5 l	110,90	0	++	+	+++	+++	+++	+++	+++	++	+++	+++	0	+	++	0	10/5/5/1	n.z.

TAB. 4 HERBIZIDE GEGEN UNGRÄSER

Agil-S ¹⁾	Propaquizafop	A	1	1 - 1,5 l	30,00 - 44,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+++	+++	++	1	-
Centurion Plus ¹⁾	Clethodim	A	1	1 - 2,5 l	33,60 - 84,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+++	+++	+++	1	-
Focus Ultra ¹⁾	Cycloxydim	A	1	2 - 5 l	61,30 - 168,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+++	+++	+++	1	-
Fusilade MAX ¹⁾	Fluazifop-P	A	1	1 - 2 l	28,60 - 57,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+++	+++	+++	1	-
Panarex ¹⁾	Quizalofop-P-tefuryl	A	1	1,25 - 2,25 l	27,00 - 48,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+++	+++	+++	1	-
Targa Super ^{1),4)}	Quizalofop-P-ethyl	A	1	0,6 - 1 l	31,30 - 52,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+++	+++	+++	1	-

* Gewässerabstandsaufgaben gemäß Konditionalität beachten!

1) Die Wirkung gegen Quecke ist nur mit der höheren Aufwandmenge gegeben.

2) Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in Meter (je nach Düse kann er unterschiedlich sein) und wenn angegeben auch ein bewachsener Grünstreifen (mit G und Meterangabe gekennzeichnet) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden - außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Unkrautbekämpfung im Nachauflauf, Bodenbedeckung mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchte, rauhes Saatbett, Grünstreifen und Querdämme kann das Risiko reduziert werden. Die Wirkung gegen Quecke ist nur mit der höheren Aufwandmenge gegeben.

3) Die Wirkung gegen Quecke ist nur mit der höheren Aufwandmenge gegeben.

4) Targa Super: Bei starkem Besatz mit größeren Un-gräsern und gegen Quecke mit 2 l Öl. +++: sehr gut wirksam; ++: gut bis ausreichend wirksam (unter günstigen Bedingungen), +: wirksam (Teilwirkung gegen sehr kleine Unkräuter unter günstigen Bedingungen und bei geringem Besatz der jeweiligen Unkrautart)

+++ : sehr gut wirksam; ++: gut bis ausreichend wirksam (unter günstigen Bedingungen), +: wirksam (Teilwirkung gegen sehr kleine Unkräuter unter günstigen Bedingungen und bei geringem Besatz der jeweiligen Unkrautart), 0: keine Wirkung; Preisbasis: unverb. empf. Listenpreise für 2025 (RWA) exkl. Mwst.; k. A.: keine Preisangaben vorhanden Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern: Regelabstand / 50 % / 75 % / 90 % Abtriftminderungsklasse

Zugelassene Fungizide zur Bekämpfung von Krautfäule und Alternaria der Kartoffel (SOLTU)

(Quelle: LK-NÖ, Julia Muck-Arthaber, BSc)

PRÄPARAT	Wirkstoff(e)	Wirkungsmechanismus laut FRAC-Code	Aufwandmenge pro ha	Wartefrist	Preis in EUR/ pro ha	Abstandsauflagen zu Oberflächen-gewässern in m ¹⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragungs-gefahr in m ²⁾
SYSTEMISCHE PRÄPARATE							
Infinito *	Propamocarb + Fluopicolide	28 + 43	1,6 l	14	51,40	5/1/1/1	-
Rival Duo *	Propamocarb + Cymoxanil	27 + 28	2,5 l	14	34,00	-	-
Zorvec Entecta *	Amisulbrom + Oxathiaprolin	21 + 49	0,25 l	7	51,40	5	* / * / * 5
LOKALSYSTEMISCHE PRÄPARATE							
AmiFlow * (Leimay + Cymbal Flow)	Amisulbrom + Cymoxanil	21 + 27	0,5 l + 0,5 l	7	49,60	-	G-10
Carial flex *	Mandipropamid + Cymoxanil	40 + 27	0,6 kg	7	42,90	-	-
Carial Start Pack (Carial flex + Ortiva)	Mandipropamid + Cymoxanil + Azoxystrobin	40 + 27 + 11	0,5 kg + 0,5 l	7	44,30	5/1/1/1	-
Copforce Extra ³⁾	Cymoxanil + Kupferhydroxid	27 + M1	2 kg	14	45,50	*/*/*/20	-
Kupfer Fusilan WG	Cymoxanil + Kupferoxychlorid	27 + M1	2,5 kg	14	80,50	*/*/*/20	G-*//*/*/20
Reboot *	Cymoxanil + Zoxamide	27 + 22	0,45 kg	7	38,40	5/1/1/1	G-10
Revus *	Mandipropamid	40	0,6 l	3	35,80	-	-
Revus Top	Mandipropamid + Difenconazol	40 + 3	0,6 l	3	43,20	5/1/1/1	G-10
Sacron WG	Cymoxanil	27	0,22 kg	14	6,80	1	-
Voyager *	Valifenalat + Fluazinam	40 + 29	1 l	7	45,80	10	G-10
KONTAKTPRÄPARATE							
Banjo *	Fluazinam	29	0,4 l	7	13,70	5/1/1/1	G-5
Copac Flow	Kupferhydroxid	M1	2,8 l	14	115,60	*/*/*/20	-
Cumatol	Kupferhydroxid	M1	2 kg	14	48,50	5/5/1/1	-
Cuprofor flow	Kupferoxychlorid	M1	2,5 l	14	43,10	*/*/*/20	-
Cupravit	Kupferhydroxid	M1	2 l	14	82,60	5/5/1/1	-
Cuprozin progress	Kupferhydroxid	M1	2 l	14	82,50	5/5/1/1	-

Funguran progress	Kuperhydroxid	M1	2 kg	14	47,10	5/5/1/1	-
Kwizda Kartoffel und Zwiebel Pack (Prevint Flow + Winner) *	Ametoctradin + Fluazinam	45 + 29	1,2 l + 0,4 l	7	50,60	10/5/5/5	G-10
Nuxine	Cerevisan	P06	2,0 l	-	?	1	G-1
Ranman Top *	Cyazofamid	21	0,5 l	7	41,90	5/1/1/1	G-5
Winner *	Fluazinam	29	0,4 l	7	20,90	5/1/1/1	G-10
Signal *	Fluazinam	29	0,4 l	7	13,50	5/1/1/1	G-5

SPEZIALPRÄPARATE GEGEN ALTERNARIA

Dagonis ***	Difenoconazol + Fluxapyroxad	3 + 7	0,75 l	3	39,90	-	-
Narita***	Difenoconazol	3	0,5 l	14	25,10	1	5/1/1/1
Ortiva **	Azoxystrobin	11	0,5 l	7	13,20	5/1/1/1	-
Promesa**	Azoxystrobin	11	0,5 l	7	13,00	5/1/1/1	-
Propulse ***	Fluopyram + Prothioconazol	3 + 7	0,5 l	21	31,80	-	G-10
Revyona ***	Mefentrifluconazole	3	1,25 l	3	27,60	-	-
Signum ***	Pyraclostrobin + Boscalid	11 + 7	0,25 kg	3	22,00	5/1/1/1	-
Tazer 250 SC**	Azoxystrobin	11	0,5 l	7	10,50	-	G-1
Zafra AZT 250 SC**	Azoxystrobin	11	0,5 l	7	14,20	5/1/1/1	-

1) Gewässerabstandsauflagen gemäß Konditionalität beachten! Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern: Regelabstand / 50 % / 75 % / 90 % Abtriftminderungsklasse; 2) Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in Meter (je nach Düse kann er unterschiedlich sein) und wenn angegeben auch ein bewachsener Grünstreifen (mit G und Meterangabe gekennzeichnet) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtrifftmin- dernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden - außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Unkrautbekämpfung im Nachauflauf, Bodenbedeckung mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchte, rauhes Saatbett, Grünstreifen und Querdämme kann das Risiko reduziert werden.

3) Bienengefährlich! Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen auf- bringen. Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind. Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden.

* Keine oder nur geringe Zusatzwirkung gegen Alternaria.

** Ortiva , Tazer 250 SC, Zafra AZT 250 SC und Promesa: Geringe Wirkung gegen Krautfäule (Phytophthora).

*** Signum, Narita, Propulse und Revyona: Keine Wirkung gegen Krautfäule (Phytophthora). WF: Wartezeit in Tagen;

Preisangaben: unverbindlich empfohlene Endverbraucherpreise (Saisonpreise) für 2025 exkl. MwSt.; k. A.: keine Preisangaben vorhanden

Zugelassene Insektizide gegen Kartoffelkäfer (Kartoffel-SOLTU)

(Quelle: LK-NÖ, Julia Muck-Arthaber, BSc)

P R Ä P A R A T	Wirkstoff	Aufwand- menge/ha	Wartefrist in Tagen	Bienen- gefährlichkeit	Preis/ha in EURO	Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern in m ¹⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragsge- fahr in m ²⁾
PYRETHROIDE (Wirkungsmechanismus laut IRAC-Code: 3A)							
Cymbigon forte ³⁾	Cypermethrin	50 ml	7	Spe 8 ₅₎	2,90	* / * / 20 / 10	G * / * / * / 15
Karate Zeon ₃₎	Lambda- Cyhalothrin	75 ml	14	Spe 8 ₄₎	9,50	* / 10 / 5 / 5	-
Raptol HP	Pyrethrine	0,6 l	3	Spe 8 ₄₎	99,90	5	-
Sherpa Duo ₃₎	Cypermethrin	0,25 l	14	Spe 8 ₅₎	19,00	* / * / 20 / 20	G * / * / 20 / 20
Spruzit progress	Pyrethrine	8 l	3	-	133,50	10 / 5 / 5 / 1	-
NEONICOTINOIDE (Wirkungsmechanismus laut IRAC-Code: 4A)							
Carnadine	Acetamiprid	1 x 0,15 l oder 2 x 0,12 l	7	Spe 8 ₅₎	11,60 - 18,50	-	-
Mospilan 20 SG	Acetamiprid	100 g	7	-	9,10	5 / 5 / 1 / 1	-
BUTENOLIDE (Wirkungsmechanismus laut IRAC-Code: 4D)							
Sivanto Prime ⁶⁾	Flupyradifuron	0,5 l	7	-	49,30	-	n.z.
ANTHRANILDIAMIDE (Wirkungsmechanismus laut IRAC-Code: 28)							
Benevia	Cyantraniliprole	0,125 l	14	Spe 8 ₅₎	27,30	-	-
Coragen	Chlorantraniliprole	60 ml	14	Spe 8 ₅₎	21,80	-	-
SPINOSYNE (Wirkungsmechanismus laut IRAC-Code: 5)							
SpinTor	Spinosad	50 ml	14	Spe 8 ₅₎	24,30	5 / 5 / 5 / 1	-
AZADIRACHTIN (Wirkungsmechanismus nicht gelistet)							
NeemAzal-T/S	Azadirachtin	2,5 l	4	-	245,30	5 / 1 / 1 / 1	-

1) Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern: Regelabstand / 50 % / 75 % / 90 % Abtriftminderungsklasse;

2) Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in Meter (je nach Düse kann er unterschiedlich sein) und wenn angegeben auch ein bewachsener Grünstreifen (mit G und Meterangabe-gekenn- zeichnet) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Unkrautbekämpfung im Nachauflauf, Bodenbedeckung mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchte, rauhes Saatbett, Grünstreifen und Querdämme kann das Risiko reduziert werden.

3) Einsatz in der Nähe von Oberflächengewässern nur mit abtriftmindernden Geräten.

4) Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen während des Bienenfluges aufbringen.

Eine Anwendung nach Ende des täglichen Bienenfluges in dem zu behandelnden Bestand ist jedoch bis 23:00 Uhr zulässig.

Es darf außerhalb dieses Zeitraumes nicht an Stellen angewendet werden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind, dies gilt auch für blühende Unkräuter.

5) Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen. Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind. Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden.

6) Das Mittel darf an blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen befliegen werden, nicht in Mischung mit Fungiziden aus der Gruppe der Ergosterol-Biosynthese-Hemmer angewendet werden. Mischungen des Mittels mit Ergosterol-Biosynthese-Hemmern müssen so angewendet werden, dass blühende Pflanzen nicht mitgetroffen werden.

Bienengefährlichkeit: Nähere Erläuterungen im Kapitel "Bienenschutzbestimmungen" im Textteil. Preisangaben: Unverbindlich empfohlene und gerundete Listenpreise für 2025 (RWA) excl. MwSt.

P R Ä P A R A T	Wirkstoff	Aufwand- menge/ha	Wartefrist in Tagen	Bienen- gefähr- lichkeit	Preis/ha in EURO	Abstands- auflagen zu Oberflächen- gewässern in m ₁₎	Abstände zu Gewässern bei Abtragungsge- fahr in m ₂₎
PYRETHROIDE (Wirkungsmechanismus laut IRAC-Code: 3A)							
Cymbigon forte ³⁾	Cypermethrin	50 ml	7	Spe 8 ₅₎	3,20	* / * / 20 / 10	G * / * / * / 15
Karate Zeon ₃₎	Lambda- Cyhalothrin	75 ml	14	Spe 8 ₄₎	11,10	* / 10 / 5 / 5	-
Raptol HP	Pyrethrine	0,6 l	3	Spe 8 ₄₎	105,20	10	
Sherpa Duo ₃₎	Cypermethrin	0,25 l	14	Spe 8 ₅₎	21,10	* / * / 20 / 20	G * / * / 20 / 20
Spruzit progress	Pyrethrine	8 l	3	-	156,5	10 / 5 / 5 / 1	-
NEONICOTINOIDE (Wirkungsmechanismus laut IRAC-Code: 4A)							
Carnadine	Acetamiprid	1 x 0,15 l oder 2 x 0,12 l	7	Spe 8 ₅₎	13,10 - 20,90	-	-
Mospilan 20 SG	Acetamiprid	100 g	7	-	11,30	20 / 15 / 5 / 1	-
BUTENOLIDE (Wirkungsmechanismus laut IRAC-Code: 4D)							
Sivanto Prime ⁶⁾	Flupyradifuron	0,5 l	7	-	55,60	-	n.z.
ANTHRANILDIAMIDE (Wirkungsmechanismus laut IRAC-Code: 28)							
Coragen	Chlorantraniliprole	60 ml	14	Spe 8 ₅₎	32,10	-	-
SPINOSYNE (Wirkungsmechanismus laut IRAC-Code: 5)							
SpinTor	Spinosad	50 ml	14	Spe 8 ₅₎	29,50	5 / 5 / 5 / 1	-
AZADIRACTIN (Wirkungsmechanismus nicht gelistet)							
NeemAzal-T/S	Azadirachtin	2,5 l	4	-	281,50	5 / 1 / 1 / 1	-

1) Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern: Regelabstand / 50 % / 75 % / 90 % Abtriftminderungsklasse;

2) Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in Meter (je nach Düse kann er unterschiedlich sein) und wenn angegeben auch ein bewachsener Grünstreifen (mit G und Meterangabe-gekenn-zeichnet) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtrifftmin-dernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden - außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Unkrautbekämpfung im Nachauflauf, Bodenbedeckung mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchte, rauhes Saatbett, Grünstreifen und Querdämme kann das Risiko reduziert werden.

3) Einsatz in der Nähe von Oberflächengewässern nur mit abtriftmindernden Geräten.

4) Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen während des Bienenfluges aufbringen. Eine Anwendung nach Ende des täg-lichen Bienenfluges in dem zu behandelnden Bestand ist jedoch bis 23:00 Uhr zulässig. Es darf außerhalb dieses Zeitraumes nicht an Stellen angewendet werden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind, dies gilt auch für blühende Unkräuter.

5) Zum Schutz von Bienen und anderen bestäubenden Insekten nicht auf blühende Kulturen aufbringen. Nicht an Stellen anwenden, an denen Bienen aktiv auf Futtersuche sind. Nicht in Anwesenheit von blühenden Unkräutern anwenden.

6) Das Mittel darf an blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen beflogen werden, nicht in Mischung mit Fungiziden aus der Gruppe der Ergosterol-Biosynthese-Hemmer angewendet werden. Mischungen des Mittels mit Ergosterol-Biosynthese-Hemmern müssen so angewendet werden, dass blühende Pflanzen nicht mitgetroffen werden.

Preisangaben: Unverbindlich empfohlene und gerundete Listenpreise für 2023 (RWA) excl. MwSt.

Pflanzenschutzmittel in Mohn (PAPSO)

Produkt	Aufwand- menge/ha	ca. Preis pro ha ¹⁾	Anwendungszeitpunkt	Bemerkungen
Herbizide				
Boxer/Fantasia*	2,5-3,5 l	23,30-32,70/ 22,70-31,80	VA (vor dem Auflaufen der Kultur)	Schwäche bei Kamille und Stiefmütterchen
Centium CS*/Clomate*	0,15-0,25 l	32,75- 54,60/ 10,10-16,80	VA, unmittelbar bis 3 Tage n. d. Saat	Spezialist gegen Klettenlabkraut, Vogelmiere, Taubnessel
Centurion Plus*	1 l	33,60	NA, 2-Blattstadium bis Ende Bestockung d. Ungräser	gg. Ungräser inkl. Einj. Rispe; wüchsige Witterung
Fusilade MAX*	1 l	28,60	NA, 2-Blattstadium bis Bestockungsbeginn d. Ungräser	gg. Ungräser; wüchsige Witterung
	2 l (Quecke)	57,20	der Ungräser; bis max. erste Blütenknospen des	
			Mohns sichtbar	
Laudis*	2,25	93,40	NA-Frühjahr, ab 4-6. Laubblatt der Kultur entfaltet	
Lentagran 45 WP*	2 x 1 kg	165,30	NA, ab 2. Laubblatt der Kultur entfaltet	Splitting-Anwendung; gute Wachsschicht nötig
				Schwäche bei Kamille u. tw. Gänsefuß-Arten
Lentipur 500*	1,3 l	16,20	VA; bis 2 Tage nach der Saat	
Roxy EC*	2,5-3,5 l	18,80-26,30	VA (vor dem Auflaufen der Kultur)	Schwäche bei Kamille und Stiefmütterchen
Insektizide				
Decis Forte*	75 ml	6,80	bei Befall bzw. ab Erreichen von Schadschwellen oder ab Warndiensthinweis	Mohnkapselrüssler
Eradicoat Max*	60 l	569,40	Bei Befall bzw. ab Erreichen von Schadschwellen oder ab Warndiensthinweis	Blattläuse, Spinnmilben
Karate Zeon*	75 ml	9,50	bei Erreichen von Schwellenwerten; vor der Blüte	gegen bissende und saugende Insekten
				max. 1-malige Anwendung i. d. Kultur
Mospilan 20 SG ²⁾	150 g	13,70	Bei Befallsbeginn bzw. ab Warndiensthinweis	gegen Mohnkapselrüssler
Fungizide				
Amistar Gold*	1 l	30,60	ES 59 bis ES 69 (Blüte)	gegen Sklerotinia
Kenja*	0,8 l	107,40	ES 60 (erste Blüten offen) bis ES 65 (Vollblüte)	gegen Sklerotinia
Polyversum*	100 g	?	3 Anwendungen bis ES 51 möglich	zur Befallsminderung bei Falscher Mehltau und
Propulse*	1 l	63,50	2 Anwendung ES 33 bis ES 59; Wartefrist 56 Tage	gegen Helminthosporium (Pleospora papaveracea)
Revyona	1,5-2 l	33,20-44,20	Anwendung 13-18 bzw. 31-55, max. 2 x 1,5 l/ha, ab ES 57 max. 2 l/ha aber max. in Summe 3,5 l/ha	gegen Sklerotinia und Alternaria-Arten
Wachstumsregler				
Medax top + Turbo**	1 + 1 l	?	Beginn des Längenwachstums bis kurz vor der Blüte	

* Schäden, einschl. Ertragsminderung, a. d. Kultur möglich; mögliche Schäden a. d. Kultur liegen im Verantwortungsbereich d. Anwenders.

Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit u. Wirksamkeit unter betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

** nicht mehr im Handel aber noch zugelassen

1) ca. Preis 2026, exkl. Mwst, größtes Gebinde

2) Notfallzulassung 1.5. bis 28.8.2026

Pflanzenschutzmittel in Kümmel (CRYCA)

Produkt	Aufwand- menge/ha	ca. Preis pro ha ¹⁾	Anwendungszeitpunkt	Bemerkungen
Herbizide				
Bandur*/Chanon*/Crimson*/ Eclaire*	2,0 l	46,90/42,40/ 38,20	VA (vor dem Auflaufen der Kultur)	feuchter, feinkrümeliger Boden optimal
Boxer*/Roxy EC*/Cofeno*/Fantasia*	4,0 l	37,30/33,60/?/ 36,40	NA; ab dem 2. Standjahr im Frühjahr nach Austrieb	Schwäche bei Kamille u. tw. Gänsefuß-Arten
Butoxone*	3,0 l	55,20	NA; ES 16 (6.Laubblatt)-51 (Knospenstadium)	Spezialist gegen Distel, Weißer Gänsefuß, Amarant
Centurion Plus*	1 l	33,60	NA, 2-Blattstadium bis Ende Bestockung d. Ungräser	
Goltix Gold*	1,5 l	31,80	NA ab dem 4 Blattstadium d. Kümmels	3-malige Anwendung erlaubt
Lentagran 45 WP*	2 x 0,75 kg	124,00	NA ab dem 2. Standjahr, 2-4 Blattstadium d. Kümmels	Schwäche bei Kamille u. tw. Gänsefuß-Arten
Lentipur 500	2 l	25,00	NA, kleine Unkräuter/Ungräser	v.a. gegen Kamille, feuchter Boden
Fusilade MAX*	1 l	28,60	NA, 2-4 Blattstadium d. Ungräser	gg. Ungräser; wüchsige Witterung
	2 l (Quecke)	57,20	Quecke 15-20 cm; Kümmel bis max. erste Blütenknospen sichtbar	
Stomp Aqua*	3,5 l	77,00	VA (vor dem Auflaufen der Kultur) oder NA (nach dem Auflaufen bis Stadium 12- 2.Laubblattpaar)	
Insektizide				
Karate Zeon*	75 ml	9,50	bei Befallsbeginn; vor der Blüte	gegen saugende Insekten
				max. 1-malige Anwendung i. d. Kultur
Fungizide				
Folicur*	1 l	16,10	bei Befallsbeginn; bis Blühmitte (BBCH 65)	gegen pilzliche Doldenerkrankungen
Luna Sensation*	0,5 l	101,80	bei Infektionsgefahr	Echter Mehltau, Möhrenschräge, Sklerotinia
Mystic	1 l	15,00	bei Befallsbeginn; bis Blühmitte (BBCH 65)	gegen pilzliche Doldenerkrankungen
Tebusha 25 EW*	1 l	19,00	bei Befallsbeginn; bis Blühmitte (BBCH 65)	gegen pilzliche Doldenerkrankungen

* Schäden, einschl. Ertragsminderung, a. d. Kultur möglich; mögliche Schäden a. d. Kultur liegen im Verantwortungsbereich d. Anwenders.

Vor dem Mitteleinsatz ist daher die Pflanzenverträglichkeit u. Wirksamkeit unter betriebsspezifischen Bedingungen zu prüfen.

1) ca. Preis 2026, exkl. MwSt, größtes Gebinde

Pflanzenschutzmittel in Lein (LIUUT)

Produkt	Aufwandmenge/h a	ca. Preis pro ha ¹⁾	Anwendungszeitpunkt	Bemerkungen		
Herbizide						
Agil-S/Ready	0,75 l	22,50/19,30	Na; 2-Blattstadium bis Bestockung der Ungräser	gegen einjährige Ungräser ausgen. Rispe		
Centurion Plus*	1 l	33,60	NA, 2-Blattstadium bis Ende Bestockung d. Ungräser			
Concert SX*	2 x 50 g	29,00	ab 5-10 cm Wuchshöhe	gg. einjährige Unkräuter		
Focus Ultra	2 l (5 l Quecke)	61,30 (153,30)	NA, 2-Blattstadium bis Ende Bestockung d. Ungräser			
Fusilade MAX*	1 l	28,60	NA, 2-Blattstadium bis Bestockungsbeginn	gg. Ungräser; wüchsige Witterung		
	2 l (Quecke)	57,20	der Ungräser; bis max. erste Blütenknospen des			
			Mohns sichtbar			
Hoestar* ²⁾	30 g	?	NA; ca. 8-10 cm Wuchshöhe der Kultur	gg. einj. zweikeimblättrige Unkräuter		
Panarex	1,25-1,5 l	27,00 - 32,40	NA, 2-Blattstadium bis Bestockungsende	gg. Ungräser; wüchsige Witterung		
	2,25 l (Quecke)	48,60	der Ungräser			
Insektizide						
Eradicoat Max*	60 l	569,40	Bei Befall bzw. ab Erreichen von Schadschwellen oder ab Warndiensthinweis	Blattläuse, Spinnmilben		
Karate Zeon*	75 ml	9,50	bei Erreichen von Schwellenwerten,	gegen bissende und saugende Insekten		
			vor der Blüte	max. 1-malige Anwendung i. d. Kultur		
Fungizide						
Amistar Gold*	1 l	30,60	ES 59 bis 69 (Blüte)	gegen Sklerotinia		
Elatus Era*	0,66 l	43,80	ES 32-69	gegen Septoria-Arten und Echten Mehltau		
Joust (nur zur Fasernutzung)	0,7 l	16,70	ES 33 - 51	gegen Echten Mehltau		
Kenja*	0,8 l	107,40	ES 60 (erste Blüten offen) bis ES 65 (Vollblüte)	gegen Sklerotinia		
Revyona	1,5-2 l	33,20-44,20	Anwendung 13-18 bzw. 31-55, max. 2 x 1,5 l/ha, ab ES 57 max. 2 l/ha aber max. in Summe 3,5 l/ha	gegen Sklerotinia und Alternaria-Arten		
Wachstumsregler						
Medax top + Turbo ²⁾	1 + 1 l	?	Beginn des Längenwachstums bis kurz vor der Blüte			

* Schäden, einschl. Ertragsminderung, a. d. Kultur möglich; mögliche Schäden a. d. Kultur liegen im Verantwortungsbereich d. Anwenders.

1) ca. Preis 2026, exkl. Mwst, größtes Gebinde

2) nicht mehr im Handel aber noch zugelassen

Auswahl zugelassener Herbizide in Sorghumhirse (SORVU) (Quelle: DI Christine Greimel, LK-Stmk)

Produkt	Wirkstoff		Wirkungsmechanismus nach HRAC-Code ^{a)}	Wirkungsmechanismus nach HRAC-Code	Aufwandmenge /ha	Preis in EUR / ha ¹⁾		Ackerkratzdandel	Acker- / Zierwinde	Unkrautgräser	W. Gänsefuß / Melde	Schw. Nachschatten	Franzosenkraut	Kamille	Knöterich	Ambrosie (Ragweed)	Abstandsauflagen zu Oberflächen-gewässern in m ²⁾	Abstände zu Gewässern bei Abtragsgefährdung in m ³⁾
Bodenwirksame Hirsemittel, früher Nachauflauf ab BBCH 13																		
Stomp Aqua	Pendimethalin	3	K1	2,5 l	55,00	0	0	++	+++	++	0	++	++	+	20/10/5/5	-	-	
Spectrum	Dimethenamid-p	15	K3	1-1,4 l	42,70-59,80	0	0	+++	++	+(+)	+++	+++	+(+)	+	20/10/5/5	-	-	
Spectrum Gold ^{NEU}	Dimethenamid-p + Terbutylazin	15 + 5	K3 + C1	2 l	45,40	0	0	++(+)	++(+)	++	+++	+++	++	++	15/10/5/1	n.z.		
Tankmischung, früher Nachauflauf ab BBCH 13, speziell für Wasserschutz- und Schongebiete																		
Stomp Aqua + Spectrum	Pendimethalin + Dimethenamid-p	3 +15	K1 + K3	2 l + 1 l	86,80	0	0	+++	+++	++	+++	+++	++	+	20/10/5/5	-	-	
Anwendung im Nachauflauf ab BBCH 12 bzw. 13																		
Casper + Silwet Top ^{NEU}	Prosulfuron + Dicamba + NM	2 + 4	B + O	0,3 kg + 0,1 l	31,50	+++	+++	0	++(+)	+	++(+)	+++	+++	+++	1 m	G-15	-	
Harmony SX + z.B. Neo-Wett ⁴⁾	Thifensulfuron-methyl + Neo-Wett	2	B	7,5 g + 0,1% z.B. Neo-Wett Split.: 2 x 7,5 g + 0,1 % z.B. Neo-Wett	24,10 48,20	++ Split.	++ Split.	0	++(+)	+++	+++	+++	++(+)	+	1 m	-	-	
Onyx	Pyridate	6	C3	0,75 l	37,60	0	0	0		+++	+++	+(+)	+	+	5/5/5/5	G-10	-	
Mais-Banvel WG	Dicamba	4	O	0,3 kg	21,70	+++	+++	0	+++	+(+)	++	++	++	++	1 m	-	-	
Mais Banvel flüssig, Kalimba	Dicamba	4	O	0,4 - (0,6 l)	11,50-(17,20) / 12,00-(18,10)	+++	+++	1	+++	+(+)	++	++	++	++	1 m	-	-	
Abkürzungen: TBA: Terbutylazin; NM: Netzmittel; k.A.: keine Angabe; Split.: Splitting Legende: +++: sehr gut wirksam; ++: gut bis ausreichend wirksam; +*: Teilwirkung, nur bei kleineren Unkräutern unter günstigen Bedingungen; 0: keine Wirkung; 1) Preisbasis: unverb. empf. Listenpreise f. durchschnittl. 5-10 ha-Gebinde (RWA 2026) exkl. MwSt.; 2) Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern: Regelabstand / 50 % / 75 % / 90 % Abfrümminderungskategorie; 3) Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in Meter (je nach Düse kann er unterschiedlich sein) und -wenn angegeben- auch ein bewachsener Grünstreifen (G) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtrümmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden - außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Unkrautbekämpfung im Nachauflauf, Bodenbedeckung (mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchten), rauhes Saatbett, Grünstreifen usw. kann das Risiko reduziert werden; 4) Registrierung für Sorghum-, Rispenn- und Kolbenhirse; 5) neue HRAC Codes für Herbizide; 6) Anwendungsfrist für Arrat: 7.11.2025; 7) Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode, wobei die Anwendung nur alle 3 Jahre auf derselben Fläche erfolgen darf. Keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen Mitteln, die den Wirkstoff Terbutylazin enthalten. Alle Angaben ohne Gewähr! Verbindlich ist die Gebrauchsanleitung.																		
Greimel, LK STMK 12/2025																		

Auswahl zugelassener Herbizide in Sonnenblumen (HELAN) (Quelle: verändert nach Dr. Josef Wasner, LK-NÖ)

Produkt	Wirkungsmechanismus laut HRAC-Code	Wirkungsmechanismus laut HRAC-Code	Aufwandmenge/ha	Preis in EUR/ha	Ackerdistel	Amarant	Bingelkraut	Franzosenkraut	Gänsefuß und Melde	Holzahn	Kamille	Klettenlabkraut	Knötericharten	Schwarzer Nachtschatten	Ausfallapp	Ausfallgetreide	Flughäfer	Hirsearten	Quecke	Abstandsauflagen zu Oberflächengewässern in m	Abstände zu Gewässern bei Abtragsungsgefahr in m 2)		
HERBIZIDE FÜR DEN VORAUFLAUF																							
Bandur/Eclair/Crimson	Acclonifen	32	F3	2 l	46,88/38,20	0	++	++	++	++	++	++	++(+)	+	+++	0	+	+	(+)	-15/10/5	G-15/10/10	-	
Bokator	Acclonifen + Diflufenikan	32 + 12	F3 + F1	1,9 l	63,80	0	++(+)	+(+)	++(+)	+++	++(+)	+(+)	++(+)	+(+)	+++	0	+	+(+)	(+)	-15/15/5	-	-	
Boxer/Roxy EC/ Cofeno/Fantasia	Prosulfocarb	15	N	4 - 5 l	37,30-46,70 ? 33,80-42,00 37,30-46,70	0	+++	+	+++	+(+)	+(+)	+	+++	+(+)	+++	0	+	++	0	10/5/5/1	n.z.		
Spectrum, Star Dimethenamid-P, Campus	Dimethenamid-P	15	K3	0,8 - 1,2 l	34,20-51,30 32,00-48,00 ?	0	+++	0	+++	+(+)	+	+++	0	+(+)	+(+)	++	0	+	+++	0	15/10/5/5	-	-
Conaxis	Dimethenamid-P + Clomazone	15 + 13	K3 + F4	1,5 l	57,70	0	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	++	0	0	0	+++	+	1	n.z.		
Successor 600/Dual Next	Pethoxamid	15	K3	2 l	68,30/?	0	++	+	+++	++	+	+++	+	++	0	0	+	+++	0	15/10/5/1	n.z.		
Stomp Aqua	Pendimethalin	3	K1	2,6 l	57,20	0	+++	++	0	+++	+++	++	++	++	++	0	(+)	++	0	20/10/5/5	G-5	5	
Spectrum Plus/Wing P	Pendimethalin + Dimethenamid-P	3+15	K1 + K3	3 - 4 l	68,50-91,30 60,80-81,10	0	+++	++(+)	+++	+++	+++	++(+)	++	++(+)	+++	+++	0	+	+++	0	-15/15/5	G-15/15/10	
Proman	Metobromuron	5	C2	2 - 3 l	69,40-104,10	0	++(+)	+	+++	++(+)	+++	++(+)	+	++	+	++	(+)	+	++	0	5/1/1/1	n.z.	
KOMBINATIONEN FÜR DEN VORAUFLAUF																							
Boxer + Bandur	Prosulfocarb + Acclonifen	15+32	N + F3	3 l + 2 l	74,90	0	+++	+++	+++	+++	++	++	+++	++	+++	+++	0	++	+++	(+)	-15/10/5	n.z.	
Bandur + Stomp Aqua	Acclonifen + Pendimethalin	32+3	F3 + K1	2 l + 3 l	112,90	0	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	+++	0	+	+++	0	-15/10/5	G-15/10/10/10	5	
Boxer + Stomp Aqua	Prosulfocarb + Pentimethalin	15+3	N + K1	2,5 l + 2,5 l	78,40	0	+++	++	+++	+++	+++	+++	++(+)	+++	+++	0	+	++(+)	0	20/10/5/5	n.z.		
Successor 600 + Stomp Aqua	Pethoxamid + Pendimethalin	15+3	K3 + K1	2 l + 2 l	112,30	0	+++	++	+++	+++	+++	++	++	+++	++	0	+	+++	0	20/10/5/5	n.z.		
Proman + Spectrum	Metobromuron+ Dimethenamid-P	5+15	C2 + K3	2-3 l + 0,8-1,0 l	103,20 - 146,80	0	+++	+	+++	++(+)	+++	+++	+	++	+(+)	++	(+)	+	+++	0	15/10/5/5	n.z.	
Proman + Boxer	Metobromuron+ Prosulfocarb	5+15	C2 + N	2-3 l + 2,5 l	92,70 - 127,40	0	+++	+	+++	++(+)	+++	++(+)	++(+)	++(+)	++(+)	++(+)	(+)	+	++	0	10/5/5/1	n.z.	
Vibiala ¹⁾	Halaxifen-methyl	4	O	1 l	?	++	+++			+++						0	0	0	0	10	G-20		
HERBIZIDE GEGEN UNGRÄSER																							
Agil-S/ Ready ¹⁾	Propaquizafop	1	A	0,75 - 1 l	22,50-30,00 19,30-25,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+++	+++	+++	++	1	-	-	
Focus Ultra/ Stratos Ultra ¹⁾	Cycloxydim	1	A	2-5 l	61,30-153,30 ?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+++	+++	+++	+++	1	-	-	
Fusilade Max ¹⁾	Fluazifop-P-butyl	1	A	0,8-1,5 l	22,90 - 42,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+++	+++	+++	++	1	n.z.		
Targa Super/ Quick 5% EC/Maceta 100/Gramfix ^{1) 3)}	Qlzaifop-p-ethyl	1	A	0,6 - 1,25 l	31,30-65,10 ? 15,80-32,80 ?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+++	+++	+++	+++	1	-	-	
1) Die Wirkung gegen Quecke ist nur mit der höheren Aufwandmenge gegeben. 2) Auf abtragsgefährdeten Flächen ist zum Schutz von Gewässerorganismen durch Abschwemmung in Oberflächengewässer ein jeweiliger Mindestabstand in Meter (je nach Düse kann er unterschiedlich sein) und wenn angegeben auch ein bewachsener Grünstreifen (mit G und Meterangabe gekennzeichnet) einzuhalten. Dieser Mindestabstand kann durch abtriftmindernde Maßnahmen nicht weiter reduziert werden - außer wenn extra angegeben; n.z. bedeutet, dass bei Abtragsgefährdung die Anwendung nicht zulässig ist; mit Maßnahmen, wie z.B. Unkrautbekämpfung im Nachauflauf, Bodenbedeckung mit Mulch, Begrünungen, Zwischenfrüchte, rauhes Saatbett, Grünstreifen und Querdämme kann das Risiko reduziert werden. 3) Targa Super: Bei starkem Besatz mit größeren Ungräsern und gegen Quecke mit 2 l Öl. 4) Nofalfzulassung von 6.3. bis 28.6.2026 gegen Ambrosie, Gewöhnliche Spitzklette, Schönmalve; +++: sehr gut wirksam; ++: gut bis ausreichend wirksam (unter günstigen Bedingungen), +: wirksam (Teilwirkung gegen sehr kleine Unkräuter unter günstigen Bedingungen und bei geringem Besatz der jeweiligen Unkrautart), 0: keine Wirkung; Preisbasis: unverb. empf. Listenpreise für 2026 exkl. Mwst.; Abstandsauflagen zu Oberflächen- gewässern: Regelabstand / 50 % / 75 % / 90 % Abtriftminderungsklasse																							

Herbizide im Ölkürbis (CUUPO) (Quelle: DI Christine Greimel, LK-Stmk)

[illegible]

Grünlandherbizide (Grünland-3GLRC, Wiesen und Weiden-3PGLC, Wechselgrünland-3RGRC), Auswahl

Produkt	Wirkstoffgehalt	Flächenbehandlung Menge/ha	Preis/ha ¹⁾	Einzelpflanzenbehandlung		Anzahl der Anwendungen	Wartefrist in Tagen	Abstände zu Oberflächen- gewässern	Bemerkungen
				Spritzen	Dochstreichgerät/ Abstreifgerät				
Clinic Xtreme ³⁾	540 g/l Glyphosate	4 l; vor der Saat	32,90	-	-	1	-	1	
Clinic Xtreme ³⁾	540 g/l Glyphosate	4 l; die behandelte Teilfläche darf maximal 30 % der Gesamtfläche umfassen	32,90	-	33 %, max. 2,66 l/ha; die behandelte Teilfläche darf maximal 30 % der Gesamtfläche umfassen	1	-	1	Während der Vegetationsperiode Mai bis August
Dicopur 500 fl.	500 g/l 2,4-D	2 l	27,70	-	-	1	28	1	
Dicopur M*	500 g/l MCPA	2 l	17,60	-	-	1	28	1	
Glyphoxx 360 TF/Landmaster 360 TF/Rosate Clean 360	360 g/l Glyphosat	2 l /ha	?	-	-	1	-	1	Während der Vegetationsperiode, vor der Saat von Folgekulturen
Harmony SX*	480,6 g/kg Thifensulfuron	45 g	101,40	0,15 g/l (max. 45 g/ha)	0,38 g/l (max. 45 g/ha)	1x Flächen-, 3x Einzelpflanzen- behandlung	14	5/5/1/1-Flächen- , 1 Einzelpflan- zenbehandlung	Nicht im Ansaatjahr anwenden.
Hoestar ^{*4)}	750 g/kg Amidosulfuron	60 g	?	0,2 g/l (max. 60 g/ha)	0,1%ig (max. 60 g/ha)	1x Flächen-, 2x Einzelpflanzen- behandlung	Gras 7; Heu 21	1	
Hurler	200 g/l Fluroxypyr	-	29,80	2 l	-	-	-	1	Vogelmiere (0,75 l/ha); 2 l (nicht im Ansaatjahr): Ampfer- Arten, Löwenzahn
Kinvara	72 g/l Fluroxypyr + 233 g/l MCPA + 28 Clopyralid	3 l	39,00	-	-	1	7	1	Nicht im Ansaatjahr; Spritzen als Teilflächenbehandlung; Nachbaufrist 125 Tage
Lodin	200 g/l Fluroxypyr	2 l gegen Ampfer-Arten; 0,75 l/ha gegen einjährige zweikeim-blättrige Unkräuter; jeweils als Teilflächen-behandlung	?	0,75 bzw. 2 l	-	1	-	1	
Mais Banvel flüssig/ Joker 480	480 g/l Dicamba	1 l	28,60 / 26,90	-	-	1	30	1	während der Vegetationsperiode; nicht im Ansaatjahr
Nasa	360 g/l Glyphosate	-	?	33 %, max. 4 l/ha	33 %, max. 4 l/ha	1	-	1	Während der Vegetationsperiode
Proclova ^{*5)}	360 g/kg Amidosulfuron + 75,49 g/kg Florpyrauxifen-benzyl	125 g + 0,25 l Netzmittel; 85 g + 0,17 l (Neuansaat)	71,00 / 64,40	-	-	1	7	1	während der Vegetationsperiode
Ranger	150 g/l Fluroxypyr + 150 g/l Triclopyr	2 l	152,10	2 l	4 % (max. 2 l/ha)	1	14	5/1/1/1	
Roundup Future	500 g/l Glyphosate	2,4 l	31,20			2	-	1	Vor einer Bodenbearbeitung, vor der Saat bzw. Pflanzung, während der Vegetationsperiode
		1,44 l	18,70			2	-	1	Während der Vegetationsperiode

Grünlandherbizide (Grünland-3GLRC, Wiesen und Weiden-3PGLC, Wechselgrünland-3RGRC), Auswahl

Produkt	Wirkstoffgehalt	Flächenbehandlung Menge/ha	Preis/ha ¹⁾	Einzelpflanzenbehandlung		Anzahl der Anwendungen	Wartezeit in Tagen	Abstände zu Oberflächen- gewässern	Bemerkungen
				Spritzen	Dochtreichgerät/ Abstreifgerät				
Simplex	30,2 g/l Aminopyralid + 100 g/l Fluoroxypyr	2 l	164,00	1 %ig	2 l/ha	1	7	1	Sonderauflagen beachten!
Tomigan 200	200 g/l Fluroxypyr	1,8 l	26,10			1	7	5	Während der Vegetationsperiode, nach dem Auflaufen
Tandus	200 g/l Fluroxypyr	-	29,90	2 l	-	-	-	1	Vogelmiere (0,75 l/ha); 2 l (nicht im Ansaatjahr): Ampfer- Arten, Löwenzahn

1) unverb. empf. Listenpreise 2026 exkl. MwSt größte Verpackungseinheit

2) Regelabstand/50/75/90 % Abtriftminderungsklasse (m)

3) Es dürfen pro Jahr und Fläche nur max. 2 Applikationen eines glyphosatehaltigen Herbizides durchgeführt werden. Die maximale Gesamtaufwandmenge ist mit 3600 g Wirkstoff (a.i.)/ha/Jahr beschränkt.

4) nicht mehr im Handel, aber noch zugelassen

5) Insgesamt nicht mehr als 1 Anwendung pro Kultur und Vegetationsperiode, wobei die Anwendung nur alle 3 Jahre auf derselben Fläche erfolgen darf. Keine zusätzlichen Anwendungen mit anderen Mitteln, die den Wirkstoff Amidosulfuron enthalten.

* kleeschonend

Präparate gegen Schnecken im Ackerbau (Auswahl)

Wirkstoff	Produkt	Menge/ha	ca. Preis ¹⁾ /ha	max. Anzahl der An- wendungen	Abstände zu Oberflächen- gewässern in m	Zulassungsumfang/Hinweise
Metaldehyd	Allowin	5 kg	37,90	max. 17,5 kg	1	Ölsaaten (3BRAC), Getreide (Dinkel-3SPEC, Gerste-3BARC, Hafer-3OATC, Roggen-3RYC, Triticale-3TRIC, Roggen-3RYEC, Weizen-3WHEC), Mais (ZEAMX), Zuckerrübe (BEAVA), Futterrübe (BEAVC), Kartoffel (SOLTU), Sonnenblume (HELAN), Ölkürbis (CUUPO), Mohn (PAPSO), Lein (LIUUT), Sojabohne (GLXMA), Wiesen und Weiden (3GRLC) - bei Befall, ab 7 Tage vor der Saat bis in den Nachauflauf
	Axcela	7 kg	35,30	3 x	1	Gerste (3BARC), Hafer (3OATC), Roggen (3RYEC), Triticale (3TRIC), Weizen (3WHEC), Raps (3OILC), Lein (LIUUT), Senf-Arten (3MUSC), Mohn (PAPSO), Zuckerrübe (BEAVA), Kartoffel (SOLTU)
	Schnecken-Linsen	3 kg	17,90	2 x	1	Getreide (3CERC), Sommerraps (BRSNS), Winterraps (BRSNW), Zuckerrübe (BEAVA), Futterrübe (BEAVC), Mais (ZEAMX), Sonnenblume (HELAN) - Bei Befall bzw. ab Erreichen von Schadschwellen oder ab Warndiensthinweis
	Luma Gold 5%	4 kg	16,00	3 x	1	Getreide (3CERC), Raps (3OILC), Mais (ZEAMX)
	Metarex Inov	5 kg	37,60	max. 17,5 kg	1	Ölsaaten (3BRAC), Getreide (Dinkel-3SPEC, Gerste-3BARC, Hafer-3OATC, Roggen-3RYC, Triticale-3TRIC, Roggen-3RYEC, Weizen-3WHEC), Mais (ZEAMX), Zuckerrübe (BEAVA), Futterrübe (BEAVC), Kartoffel (SOLTU), Sonnenblume (HELAN), Ölkürbis (CUUPO), Mohn (PAPSO), Lein (LIUUT), Sojabohne (GLXMA), Wiesen und Weiden (3GRLC) - bei Befall, ab 7 Tage vor der Saat bis in den Nachauflauf (Zulassungsaufgaben beachten!)
Eisen-III-phosphat	Ferrex	6 kg	29,20	5 x	1	Ackerbaukulturen (3ARAC) - bei Befall bzw. ab Erreichen von Schadschwellen
	Sluxx HP ²⁾	7 kg	32,50	4 x	1	Ackerbaukulturen (3ARAC) - nach Erreichen von Schwellenwerten oder nach Warndienstaufruf

1) ca. Preis 2026, exkl. Mwst, größtes Gebinde

2) auch im Biolandbau erlaubt